



码上看报



码上订报

# 苹果丝瓜,是蔬菜还是水果? 首批开采,售价40元/公斤!

近年来,市场上出现了很多水果蔬菜,很多蔬菜纷纷冠以水果的头衔,例如,水果玉米、水果萝卜、水果黄瓜、水果冬瓜等,那么苹果丝瓜你听过吗?近日,位于湖南省长沙县高桥镇金桥村的联彩农业生产基地里,农业专家推广的新品种——苹果丝瓜进入采摘旺季,售价为40元/公斤。

8月17日上午,走进联彩农业生产基地,只见连片的藤蔓上绽放出朵朵黄花,种植的苹果丝瓜迎来了采摘期,多位当地村民正在地里将苹果丝瓜娴熟地采摘、打包,准备装车运往长沙各大餐饮门店。

“我们种植的丝瓜叫苹果丝瓜,也叫台湾丝瓜,还被大家称为水果丝瓜。”联彩农业生产基地负责人肖志祥告诉笔者,今年年初,在长沙农业科学院周清华老师的指导下,他们引进了一批台湾的苹果丝瓜种子,4月底开始种植苹果丝瓜苗,经过细心的呵护,苹果丝瓜苗长势很

好,苹果丝瓜陆续成熟。“这种丝瓜主要呈椭圆形,好看好吃好卖,不单外观优美,青绿可爱,而且品质出众,口感爽滑,清甜化渣,风味独特,清蒸、清炒和滚烫均可,甚至冰镇、沙拉和鲜食都可以,味道清爽。”肖志祥说,深绿色的苹果丝瓜外形可爱,胖墩墩,入口有淡淡苹果味还带着浓郁的丝瓜清香,多吃两口还有点甜。

“苹果丝瓜喜热,对气候要求很高。”周清华告诉笔者,前期他们采用大棚种植保证温度,到了后期将大棚拆除,让瓜苗充分吸收热量,增长光照时间,确保产量。周清华说,苹果丝瓜原产于台湾,近些年引入内地,目前很多省份都有种植,口感比普通丝瓜更好吃,除了含有丰富的维生素和较高的营养价值外,还具有较高的药用价值。

“我们将不断研究,推出本土品种,这样可以降低种子的成本,也可长期保障产量,有稳定的市场。”周清华说。



“如今供不应求,各大餐饮门店每天要我们送货。”肖志祥介绍,今年是小批量示范种植,共种植了十亩,亩产2千斤,每天都是周边农户在帮忙打理和采摘。肖志祥介绍,苹果丝瓜耐运输,好储存。苹果丝瓜比普通丝瓜结瓜多,单个瓜的重量大约有一斤多,不易老化,生长期短。苹果丝瓜作为一种时尚蔬菜,一上市就受到了人们的青睐,预计明年会研究一种简易栽培方法,种植面积扩大到20亩。

(罗展)

## 鲜食玉米家族 可分六大类

鲜食玉米,作为一种粮食、蔬菜、水果兼用的特殊作物,是我国作物发展历史上种植面积增加最快的农作物,现在全国已种植有2500多万亩。鲜食玉米包括哪些品类,如何分类?中国农业科学院作物科学研究所高级农艺师田志国从鲜食玉米品种发展和本身的特性,为广大消费者分类,以便于满足不同需求。

**第一大类,就是所谓的水果玉米,也就是甜玉米。**市场上大多是超甜玉米,有黄色、白色、黄白双色以及紫黑色,鲜嫩多浆,可蒸煮、配菜、煲汤等,部分品种像水果一样鲜食(生吃)。

**第二类,是传统型的糯质玉米,**蒸煮后,黏、软、香,有嚼劲。但放凉后会变硬,需加工再使用。它们一般是上世纪90年代的品种,也有现在育出的花色品种。

**第三类,是软粘型的糯质玉米,**在传统糯质玉米基础上,通过育种技术转入松软型玉米粒。这一类糯玉米,蒸煮后软、香、黏、甜,放凉后不会变硬。籽粒比传统糯质玉米粒要大,如京科糯2000、万糯2000等,花色品种也多样,有白色、黄色、黄白色、紫白色、紫黑色等。

**第四类,是市场上火热的“甜加糯”或**

**“糯加甜”型玉米。**这类玉米是甜玉米和糯玉米的相互改良,甜质和糯质成分重组重合创制的聚合甜糯两种品种特点的新类型。市场上有1:3和7:9两种大类型,也有较多花色类型。

**第五类,是功能型甜糯玉米,**在甜糯玉米的基础上,通过育种选育出高叶酸、高赖氨酸、高维生素和高花青素等具有一定功效型的鲜食玉米品种,也具有较多花色类型。

**第六类,是专用型甜糯玉米,**具有特定的专用用途,如粒用、打浆用、笋用等。

(据《南方农村报》)

## 香菇菌丝『不吃料』该咋办

香菇市场需求大,种植前景广泛,而且香菇种植行业周期短、见效快。但不少菇农在种植香菇的过程中,经常会遇到菌丝“不吃料”的现象。那么具体是怎么回事?如何防治?

### 主要原因

培养料的配方不合理,配制不科学,如碳氮比不合理,含水量过高,pH值不适当,料内含有松木、杉木等木屑,都能使菌种块不萌发导致“不吃料”。

在一级菌种和二级菌种的制作过程中,所用的菌种必须是活力强的菌种。如果接入的菌种在不良环境下长期贮藏或培养时间过长,造成菌种衰老,失去生长活力,从而引起“不吃料”现象。

菌种瓶内潜入螨类,咬食菌种块,致使菌丝消失。由于接种后的试管堆放过多,或栽培料堆放过密过紧而导致其内温度过高,抑制了菌丝的正常生长。

### 防治方法

种植户要到信誉度高、经济实力强、技术力量雄厚的单位购买高产优质菌种。

接种时仔细检查,确保菌种无感染。科学配料配制培养料时,严格按照各种食用菌生长要求的条件调节好培养料的含水量和pH值,使用适量菌种。

接种前,一般会对接种室消毒处理,但消毒药剂用量一定要适当,避免过量使用。接种后,若需要再其中进行发菌的话,则应彻底通风换气,避免室内残留消毒药气,影响菌丝萌发。

在发菌时温度一般保持在20-25摄氏度之间,低于20摄氏度时,相应地采取保温措施;高于25摄氏度时,要采取相应的散温措施。

(王华)

广告

# 首批入驻西部(杨凌)农业服务大市场企业

咨询电话: 13659113232



四川年年丰生物科技有限公司  
陕西年年丰德农植保技术有限公司  
电话: 18629354289 400-7791-120



湖北施特富生物科技有限公司  
电话: 0722-4515889



四川国沃生物科技有限公司  
电话: 0816-2750988



陕西云平农业科技有限公司  
电话: 15319149111 13659113232



济南亚康力诺生物工程有限公司  
电话: 0531-88275267



雷米斯生物技术(江苏)有限公司  
电话: 0518-86518669



河南省永和肥业有限公司  
电话: 15093469555



杨凌贝珠生物科技有限公司  
电话: 029-87093396



陕西光碳生态农业有限公司  
400-8854-998



济南亚康力诺生物工程有限公司  
电话: 029-85207237



山东土木启生物科技有限公司  
电话: 0531-55708689



陕西宝石莱环保科技有限公司  
电话: 029-88645501



地康食安(北京)农业科技有限公司  
电话: 400-112-1133 1391130100