



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码, 咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午 9:00-12:00
下午 3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁
西北农林科技大学教授
常宗堂
西北农林科技大学园艺学院研究员
李省印
西北农林科技大学园艺学院研究员
花蕾
西北农林科技大学植保专业研究员
黎九州
杨凌职业技术学院副教授
史瑞仁
杨凌职业技术学院高级兽医师
谷撑贤
杨凌职业技术学院高级兽医师

山西省运城市读者徐建英问:

雏鸡孵化胚死壳中的原因是什么



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,雏鸡胚胎发育时间不同,胚死壳

中的原因也不同。以 18-21 日龄胚胎不能出壳而言,有以下原因:1.种鸡营养不足,导致雏鸡啄壳无力。2.后期孵化温

度过高(超 38.1 度)而致胚死。3.孵化环境湿度(低于 60%)不够,啄壳困难致死。4.种鸡鸡龄偏大或种公鸡的弱精所致。

陕西省延安市读者张强问:

羽衣甘蓝育苗应注意哪些问题



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说,羽衣甘蓝育苗适宜温度保持在 15-25℃,夏

天育苗要注意遮光防高温,防雨水冲刷,保持一定温湿度。播种不能太深,太深影响种子出土,盖籽基质厚度不能超过 5 毫米。播种不能太

密,不然苗子拥挤,通风透光差,容易发生苗期病害,播种平盘保持苗距 2 厘米左右,分苗盘采用 50 穴孔穴盘,每穴排苗 1 株。

陕西省西安市鄠邑区读者沈小刚问:

怎样防治葡萄黑星病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学冯存良研究员回复说,防治葡萄黑星病,应做好以下措施:清除越冬菌源。秋季落叶

后,剪除病枯梢及病僵穗,深埋或烧毁。春季发芽前,刮老皮,喷 3-5 波美度石硫合剂、硫酸铜 10-15 倍液。喷药保护。葡萄展叶后到果实

着色前,每隔 10-15 天喷药一次,花前和花后喷药很重要。药剂有 1:0.7-1.5:240 波尔多液、晴菌唑、醚菌酯、多菌灵可湿性粉剂、代森锰锌粉剂等。

陕西省渭南市蒲城县读者党军问:

花椒叶子上有黑点,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授康克功,西北农林科技大学研究员冯存良回复说,这是花椒炭疽病引起的黑点,防治办法如下:

人工防治。进行深耕翻,防止偏施氮肥,降雨后及时排水,改善椒园通风透光条件,增强椒树抗病力。及时清除病残体,集中烧毁。药剂防治。冬季结合清洁椒园,喷施 1 次 3-5

波美度石硫合剂。春季嫩叶期、幼果期及秋梢期,各喷 1 次:15% 晶体石硫合剂 180-200 倍液、80% 炭疽福美可湿性粉剂 800 倍液,50% 除雷百利可湿性粉剂 800 倍液或醚菌酯、咪鲜唑等。



陕西省榆林市读者吴菲菲问:

羊口疮病的病理特点有哪些? 怎样治疗



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,羊口疮(羊传染性脓疱)病的病理变化局限于口腔。其病理变化过程为

由开始出现丘疹,再液化为疮疹(先期水疱,后有化脓菌感染成脓疱),脓疱破溃形成溃疡面,最后结缔组织增生形成厚的疣状痂皮而痊愈。

治疗羊口疮病,首先要做好疫苗预防工作,其次注意羊舍消毒。发病早期看全群紧急防疫;治疗宜用淡盐水或 0.2-0.3% 高锰酸钾液冲洗口腔,创面涂碘甘油和冰硼散。



甘肃省天水市读者牛芳问:

苹果树叶子边缘颜色变褐 用手捏能捏碎,原因是什么



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院马志峰教授经电话咨询了解到,全园只有几棵树的叶片边缘或叶尖焦枯,判断是果树根系出了问题,最大可能是

这几棵树感染了根腐病。土壤板结、积水、通气不良、杂草丛生等因素,都可能诱发果树根腐病。果农可根据根腐病的防治方法进行治理。

陕西省咸阳市乾县读者安喜农问:

猪口蹄疫和猪水疱病有哪些区别



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,这两个病的病原不同,前者是由口蹄疫病毒感染引

起,后者是由猪水疱病毒感染引起;前者可以感染牛羊和人(血清型不同),后者只感染猪;理论上这两个病都是四季均可发生,但前者具有秋末发病、冬季

加剧、春暖减少、夏季平息的显著特点。在实际管理中,这两个病的临床症状非常相似,难以区别,确诊需经实验室诊断。

(本版内容由禹阿娟整理)