



码上看报



码上订报

农业科技报 全媒体出品



扫二维码，咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段：

每周一至周五  
上午9:00-12:00  
下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学园艺学院研究员

李省印

西北农林科技大学园艺学院研究员

花蕾

西北农林科技大学植保专业研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

甘肃省平凉市读者张发新问：

### 空心菜白锈病的症状有哪些



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授谷撑贤回复说，空心菜白锈病主要为害空心菜的叶片。发病

初期叶片正面出现淡黄至黄色斑点，后渐变为褐色；叶片背面产生白色隆起状疱斑，近圆形或椭圆形至不规则形，有时愈合成较大

的疱斑。发病后期叶背面的疱斑破裂散出白色孢子囊。叶片受害严重时病斑密集，病叶畸形，导致叶片脱落。

陕西省延安市读者李秀贤问：

### 怎样治疗肉牛产后缺奶症



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，肉牛产后缺奶，需要检查以下三点：

1. 看母牛是否患有其他疾

病；2. 是否有乳房疾病。3. 日粮营养是否不全。以上可以确诊时，需做针对性治疗。如果无法确诊，也没有其他症状，可以内服通乳汤。黄芪45克、党参30克、当归30克、白术24

克、茯苓30克、路路通24克、穿山甲24克、王不留行60克、通草15克、瓜蒌45克、甘草18克。每天一剂，煎汤早晚内服，连服三天。每天加喂煮熟的黄豆1斤，压扁拌料，连用7天。

山西省太原市读者李子文问：

### 黄瓜叶片有水渍状斑点 病斑中央干枯脱落穿孔，是虫害吗



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，不是虫害，是典型的黄瓜细菌性角斑病在干燥环境下造成的叶片穿孔现象，由细菌假单胞菌属的丁香假单胞杆菌引致，温暖高湿环境下易发病。

防治方法：将空气相对湿度控制在70%以下，并于发病初期，选用88%水合霉素可溶性粉剂1500-2000倍液或20%

噻唑锌悬浮剂600-1000倍液、或2%春雷霉素水剂500倍液、或3%中生菌素可湿性粉剂600-800倍液、或20%叶枯唑可湿性粉剂1000倍液、或47%春·王铜可湿性粉剂700倍液、或78%波尔·锰锌可湿性粉剂500倍液、或40%琥·铝·甲霜灵可湿性粉剂600倍液、或50%氯溴异氰尿酸可湿性粉剂1200倍液喷雾，间隔7天1次，连续防治3-4次。



陕西省延安市读者赵庄问：

### 苹果树缺素症怎样解决



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授马志峰回复说，地下管理是保证果树正常生长结果的基础。建议做好以下事项：1. 秋施腐熟

有机肥，每亩使用量2000公斤左右，混加多元复合肥50公斤，为果树根系正常生长和吸收创造良好的土壤条件。2. 清除树冠下部的杂草，耕翻树盘土壤，保证土壤疏

松透气。3. 树冠下土壤覆盖黑色地膜，保墒增温。做好以上几点，果园土壤的水肥气热条件就能得到明显改善，也能从根本上解决果树缺素问题。

河南省郑州市读者马征收问：

### 母猪可以饲喂育肥猪饲料吗



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，后备母猪可以饲喂育肥猪饲料，但

要控制喂量，防止母猪过肥，以求体成熟和性成熟同步。怀孕和哺乳母猪都不要饲喂育肥猪饲料，而应该饲喂母猪专用饲

料，以保证胎儿正常发育和母猪分娩后有充足的乳汁哺育仔猪，防止母猪减重过大，影响下胎配种。

陕西省咸阳市乾县读者尚桂娟问：

### 梨树树皮发黑怎样防治



答：西北农林科技大学研究员冯存良回复说，这是梨树树干腐烂病，是由梨黑腐皮壳侵染所引起。春季盛发，夏季停止扩展，但危害较春季轻，秋季再次活动。

农业防治：加强果园的栽培管理，改善卫生条件，以增强树势，提高寄主的抗病力。

化学防治：拂蓝克、腐殖酸铜、20%丙环唑乳油125倍液和新腐迪膏剂，这4种药剂的治愈率均高。



湖北省武汉市读者万晓力问：

### 怎样提高雏鸡饲养成活率



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说，提高雏鸡饲养成活率，要注意以下两方面问题。一是先天性遗传问题。不得选用有遗传疾病

的雏鸡苗，如淋巴细胞白血病、马立克氏病、鸡白痢等。二是饲养管理要科学。饲养管理方面包含较多因素，如环境消毒、温度控制、湿度调整、密度合理、光照合理、通风适宜、防疫程序

合理并免疫及时、饮食卫生、饮食营养搭配合理、疾病及时预防控制、饲养环境设施条件配备良好等。养殖户做好多个方面协调配合工作，方能提高雏鸡成活率。

(本版内容由禹阿娟整理)