




码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五 上午9:00-12:00 下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学园艺学院研究员

李省印

西北农林科技大学园艺学院研究员

花蕾

西北农林科技大学植保专业研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

山东省临沂市读者刘云问:

金银花什么时期采摘最佳



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授王渭玲回复说,采摘是影响金银花质量的一个重要环节,一般在5月中下旬采摘第一茬(批)花,6月中下旬采摘

第二茬(批)花。最佳采摘时间:花朵的上半部膨大但不开放,呈青白色。采摘过早,花青嫩,产量低;采收太晚,花朵开放,降低质量。一天当中在清晨和上

午采收,花蕾不易开放,养分足、气味浓、颜色好。下午采收应在太阳落山以前结束,因为金银花的开放受光照制约,太阳落山后成熟花蕾就要开放,影响质量。

陕西省杨凌示范区读者方思义问:

西葫芦烂果怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,疑似西葫芦伤口感染了灰霉病菌或疫霉病菌,温暖潮湿、通风不良环境下易发病。建议设施内加强

通风、摘除病果、清除田间病残体,并按药剂包装说明选喷普力克或乙磷铝、杀毒矾、百菌清+腐霉利或啞霉胺、异菌脲或醚菌酯等进行喷雾,以传



陕西省榆林市读者刘嘉坤问:

肉羊口蹄疫病的潜伏期为多久



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑

贤回复说,口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的一种偶蹄兽急性传染病,其潜伏

期大多数只有1-2天时间,也有潜伏期长达一周的病例。

四川省成都市读者张佳问:

韭菜叶尖发黄怎样管理



答:经杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂和李省印会诊回复如下:

韭菜叶尖发黄原因较多,缺肥缺水、温度过高或过低,缺乏钙、镁、硼、锌、铁等某些中微量元素,病害(叶枯病、灰霉病、疫病)、虫害(韭蛆)、药害、

氨气等都可以引起韭菜叶尖发黄变干。从图片上韭菜叶尖干条斑有黑褐色霉层来看,疑似为韭菜叶枯病,建议在韭菜叶面按照产品说明喷施腐霉利或啞霉胺、异菌脲+普力克或乙磷铝、杀毒矾等,并在药液中加入少量洗衣粉,以增加药液展着性。



甘肃省武威市读者陆晓雯问:

头胎母羊产羔后,奶水非常浓稠有点粘手,小羊能吃吗



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,母畜刚分娩后的初乳

都是浓稠微黄的,除了对新生幼畜提供营养作用外,还有促使胎便排出的作用;更重要的是,初乳中含有丰富的母

源抗体,这是新生幼畜对抗各种传染病的坚强盾牌。因此,这种初乳不但能吃,还应让小羊吃足吃好。

陕西省渭南市读者党爱霞问:

花椒树什么时候修剪



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员冯存良回复说,修剪的主要作用是利于花椒树生长和结果,提高产量。花椒树的修剪时间需要从花椒树的树龄、长势、品种,以及种

植地区温度等多方面进行考虑。一般情况下,花椒树一年四季都能进行修剪。不过幼龄树和结果花椒树多在秋季花椒收获后进行修剪,避免在春季修剪,因为伤流过多会导致花椒树结果量下降。

如果是生长情况比较差或是老龄花椒树,可以选择在春季进行修剪,避免在冬季给花椒树修剪。冬季气温较低,修剪不当容易导致花椒树冻害及枝条干枯,影响花椒产量。

河南省新乡市读者张柏桥问:

蛋鸡输卵管炎的病因有哪些



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,输卵管炎是蛋鸡的一种常见病,临床上以卵巢、输卵管、腹膜发炎为特征,严重时卵泡变形、充血、出血,呈红

褐色或灰褐色,甚至破裂。该病病因比较复杂,是威胁养鸡业健康发展多发病之一。各种疾病均会引起输卵管炎,如新城疫、禽流感、减蛋综合征、传染性支气管炎、传染性喉气管炎、脑脊髓

炎、鸡痘、肿头综合征等。此外,鸡舍环境卫生条件太差,细菌滋生(如白痢沙门氏菌、大肠杆菌、副伤寒杆菌等),导致泄殖腔受到污染,从而侵入输卵管,导致输卵管炎的发生。

(本版内容由赵思懿整理)