



码上看报



码上订报

# 寒潮过后果树咋管护?

近期,我国部分县市出现中雨雪,局地暴雪。此次降温降雪对于果树影响较大,特别是对樱桃、杏、李、桃、猕猴桃等早花早实树种,可能会造成花器器官冻害,并伴随授粉受阻,降低坐果率,从而影响果品质量、造成减产等。广大果农可采取以下补救措施:

**清除积雪。**及时把树干根颈部位的积雪清除掉,根颈部位未培土的要及时培土防冻。若大棚受损压坏,要及时修复,确保棚内果树不受冻害。

**树木修剪。**冻害较轻的果树植株将冻害部位剪截。被雪压坏的枝条修剪后及时用封剪油或伤口保护剂涂抹剪口,以促进伤口愈合,防止病菌侵入。

**及时喷施杀虫杀菌剂。**果树遭受冻害后,树木衰弱,抵抗力差,容易发生病虫害,应及时喷施保护剂,并注意杀虫、防治病虫,尽量减少因病虫害造成的损失。

**人工授粉。**雨雪后,随着气温升高,抓紧时间授粉,对未受冻的花朵及时人工授粉,确保正常结果,以减少损失。

**疏除受冻的花、幼果和叶片。**寒潮过后,对果园进行观察,判断冻害



资料图片

发生情况,发生冻害的幼果、幼叶表现为变黑、变褐,确认不能缓解后,及时抹除受冻害的花和褐变幼果,摘除枯萎、发黄的冻叶,以利于节约养分、缓和树势。对于冻害较轻地块适当推迟抹芽、摘心、疏果时间。在疏果时要仔细,在果够用情况下,尽量留用果面光洁的好果;在果不够用情况下,为保证产量,要劣中选优,尽量多留果,争取把灾害带来的损失降到最低。

**加强肥水管理。**受冻果园,要加强肥水管理,促发隐芽萌发,尽快恢复树势。在气温回升后,在叶片尚存的情况下,喷施含腐殖酸、氨基酸的叶面肥或苯氨基嘌呤、芸苔素等植物生长调节剂,每周1次,连喷3次。并尽快追肥,提高树体的营养水平,增加单果质量,保证产量。

(吴向辉 于涛)

## 春季如何种好樱桃树

樱桃是日常生活中常见的水果,由于营养价值较高,收益不错,近年来在市场上颇受欢迎。春季正是种植樱桃树的好时机,但种植樱桃树要讲究科学的方法。

### 扦插法

扦插法相对比较简单。春夏交替时(4月下旬至5月上旬),选取长势较好、枝条粗壮的作为扦插条。每棵枝条上保留几片叶片,用剪刀把枝条截取下来,然后把要扦插部分用剪刀进行斜剪。这样斜剪的作用是促进生根,然后把枝条放入生根水溶液中浸泡1至2小时后可以扦插。

扦插时最好选用河沙、泥炭土等松软透气的土壤,作为扦插的苗床。扦插后注意保持土壤的湿度,一般情况下,60天左右的时间即可

生根,待芽根生长较长的时候就可以进行移栽。

### 播种法

播种大都选在春天。播种时,直接把种子插入土壤里,覆盖一层薄土,有条件的可以浇洒一些生根水溶液,再覆盖一层保鲜膜。一般情况下,10-30天即可发芽,待嫩芽长到5-10厘米左右就可以移栽。

要注意提前采收樱桃果实。樱桃成熟后挑选果实饱满的作为种子留用。去掉外面的果肉,取出里面的樱桃核,用清水把核冲洗干净,主要是冲洗掉核上的果肉及糖分。可用高锰酸钾兑水浸泡两小时,目的是消毒,确保种子的发芽率。捞出浸泡过的种子后,用清水清洗干净,放在阴凉处晾干1-2天即可播种。

(卢怀远)

广告

<p><b>科尔沁左翼中旗人民法院公告</b> 白全宝: 本院受理北京友诚诚投资管理有限公司与你融资租赁合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本【诉讼请求:一、判令被告支付原告未付租金102019元;二、判令被告支付原告合同约定的逾期违约金。合同期限内的逾期违约金主张,自2021年2月12日开始,以102019元为基数,按照每日万分之五为标准计算,计算至实际给付之日止;三、判令被告按合同总额的10%支付违约金10201元;四、判令被告支付原告诉讼费代理费12000元;五、确认原告为车辆抵押权人。】、应诉通知书、举证通知书、权利义务告知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过30日视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后15日和15日内。并定于举证期限届满后的第3日即2023年5月10日8时40分在科尔沁左翼中旗人民法院宝山法庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 二〇二三年三月二十日 科尔沁左翼中旗人民法院公告</p>	<p><b>科尔沁左翼中旗人民法院公告</b> 齐铁龙: 本院受理刘兰英与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本【诉讼请求:一、要求被告偿还二笔借款本金40000元;二、要求被告给付二笔借款利息35200元(20000元×1分×89个月,2015年9月8日至2023年2月8日);20000元×1分×88个月,2015年10月2日至2023年2月2日),本息合计75200元;三、要求被告给付自起诉之日起到实际清偿之日止,以借款本金为基数,按月利1分的利息计算;四、要求案件受理费用由被告承担。】、应诉通知书、举证通知书、权利义务告知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过30日视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后15日和15日内。并定于举证期限届满后的第3日即2023年5月10日9时0分在科尔沁左翼中旗人民法院宝山法庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 二〇二三年三月二十日 科尔沁左翼中旗人民法院公告</p>	<p><b>科尔沁左翼中旗人民法院公告</b> 齐宝胜、桂柱: 本院受理原告张鹏诉你们买卖合同纠纷一案已审理终结,现依法向你公告送达本院(2023)内0521民初341号民事判决书,自公告之日起30日(或涉外为3个月)内来本院宝山法庭领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满之日起15日(或涉外为30日)内向本院递交上诉状及副本,上诉于通辽市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。 二〇二三年三月二十日 <b>拍卖公告</b> 受委托,我公司对以下物资(废旧物资、搅拌站、废金属、废钢材、钢筋边角料、废旧模板、废合车、整厂资产、废设备、废工程车辆、废电缆、废电机、废变压器、活动板房、钢筋棚、废塑料、机动车、房产、水泥石泥、办公用品、废木料、龙门吊等)面向社会公开拍卖: 一、拍卖时间:2023年4月1日至30日 10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 二、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.cai123.org.cn) 三、展示时间:标的开标前48小时 四、展示地点:标的所在地五、报名时间:截止开拍前六、竞买保证金:缴纳竞买保证金须联系拍卖公司或详见拍卖会竞买须知,按拍卖会的要求缴纳竞买保证金。联系电话:17717112823。 中载拍卖(河北)有限公司 <b>更正公告</b> 2023年2月14日山东龙口农村商业银行股份有限公司在《农业科技报》刊登的《债权转让告知函(三)》中,借款人烟台佳水水产有限公司更正为温国政,特此更正。 本版广告为信息资讯,不作为签订合同及承担法律责任的依据。</p>
--	--	--

## “榴莲自由”真的要来了! 国产榴莲将大规模上市

近日,海南省三亚育才生态区榴莲基地种植的1400亩榴莲已挂上幼果,将于今年6月份成熟上市,预计产量可达3500斤/亩,每亩产值在10万元以上。

三亚市农业农村局负责人介绍,三亚在4年前引进了榴莲品种,经过多年培育,驯化后的榴莲品种于今年开始规模结果。目前三亚各区共种植了1万余亩榴莲,已陆续挂果,未来将有更多的三亚榴莲走入市场。

据了解,海南锚定“成为全国热带新奇特优农产品的核心产区”的定位,

已累计引进榴莲、释迦、榴莲蜜、菠萝蜜、燕窝果、马梅果等优良品种,全省推广带动种植热带优异果蔬30余万亩,推动热带特色高效农业转型升级。

“以往国内主要依靠进口东南亚地区的冷冻榴莲,在口感和糖度上都会打折扣。”三亚市农业农村局负责人表示,在三亚出产的榴莲不仅糖度较高,还在时间上有着先天优势,可以用生鲜的方式进入市场,很好地满足国内市场对新鲜榴莲的需求。

(据人民网)

## 果树易得黑斑病这样防治更安全

### 危害

黑斑病是很多果树中常见的一种病,影响植物正常生长发育。发病初期,叶片表面出现红褐色和紫褐色小点,逐渐扩大成圆形或不定型的暗黑色病斑。病斑周围常有黄色晕圈,边缘呈放射状,病斑直径约3-15毫米。后期病斑上散生黑色小粒点,即病菌的分生孢子盘。严重时植株下部叶片枯黄,早期落叶,致个别枝条枯死。

### 防治措施

加强肥水管理,根基增施有机肥,树冠要多次喷施瓜果壮蒂灵,可使果

树的营养输导管变粗,加强营养的输送量,保花保果。

对病害的预防,应在新梢抽生时,全园喷洒护树将军,有效抑制空气中和树体外的病菌复制传播,起到杀菌消毒的作用。

在病害高发期或病症初现时,可用针对性药剂+新高脂膜直接喷施,一方面可增强树势,提高抗病能力,另一方面可以提高农药效果。

新叶展开时,喷4%氟硅唑或20%硅唑·咪鲜胺800倍液-1000倍液,或75%百菌清500倍液,或80%代森锌500倍液,7-10天1次,连喷3-4次。

(任柏全)

## 桃树春季管理措施

### 追肥灌水

桃树需要定期追肥和灌水。具体追肥次数和时期要根据品种、产量、树势等确定。在追肥时,可以采用花前肥、坐果肥和催果肥等方法,并结合叶面喷肥来防治某些缺素症。灌水方面,桃树发芽前要灌一次萌芽水,春季干旱时要及时灌水,但开花期应禁止灌水。出现强降水时,要及时排水以防水害。

### 疏花疏果

疏花疏果也是春季管理的重要工作之一。开花和坐果时期进行疏花疏果可以消耗一定的养分,因此要尽早进行。具体的方法是,在花后15天左右开始疏果,先疏除畸形果、病虫害和长中果枝上的小果等,然后按留果量合理安排疏果的数量。留果量的确定方法有四种,包括依产定果法、果枝定果法、间距定果法和叶果比法。可以根据品种的结果习性选择合适的方法。

### 病虫害防控

在春季,要注意防治蚜虫、红蜘蛛、桃蛀螟等虫害。对于蚜虫,可以采用10%吡虫啉可湿性粉剂喷洒,温度高时也可采用喷啶虫脒的方法来防治。对于红蜘蛛,可以结合防治蚜虫,在防治蚜虫的药剂中加入四螨嗪或哒螨灵。对于桃蛀螟,要在硬核期前进

行一次“大扫除”,并采用常用农药如灭幼脲3号或杀铃脲等加入新三唑类药剂来杀灭它们。

### 修剪整形

春季是桃树修剪的最佳时期之一,可在桃树萌芽前期、萌芽期、开花前期进行,主要是对枝条进行短截和修剪,以促进树木的分枝和萌芽。此外,还可以进行整形修剪,使桃树更加美观、整齐。

### 病害防治

春季是桃树病害易发生的时期,因为湿度和温度的变化,容易引发疾病。桃树疾病主要包括炭疽病、疫病、细菌性溃疡病等。要做好病害的预防和防治工作,一般可以采用药剂喷洒、清除枯枝败叶等方法,减少病害的发生。

### 保护花朵

春季的桃花非常嫩,容易受到风雨等自然因素的影响。因此需要采取措施保护花朵,保证花朵正常开放。常见的措施包括用竹竿支撑花枝、覆盖防风网等。

### 注意水分管理

春季气温升高,桃树水分的需求也逐渐增加。要根据气候和土壤情况,及时灌溉,确保土壤湿润。但也要注意不要过度浇水,避免引起水渍病等问题。

(据《陕西农村报》)