




码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码 咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段：

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学园艺学院研究员

李省印

西北农林科技大学园艺学院研究员

花蕾

西北农林科技大学植保专业研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

河南省洛阳市读者牛幸福问：

辣椒蓟马如何防治



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，防治辣椒蓟马，要根据田间具体情况，采用农业、生

态、生物、物理等综合措施进行防治。可于辣椒现蕾初期酌情按包装说明浓度选喷甲维盐、噻虫嗪、艾绿士(乙基多杀菌素)、藻盖杀、阿维菌

素、氟虫腈、高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、啉虫脒、甲氰菊酯、多杀霉素等，设施内可增设置防虫网，并用蓝板诱杀害虫等。

四川省宜宾市读者马晓然问：

李子树花苞期怎样打药



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员吕平会回复说，李子树在显蕾期也就是花苞期也有病虫害发生，危害花

蕾，导致花腐。此时主要以病害为主，虫害很少，因此建议使用百菌清或多菌灵，按包装说明浓度进行喷施。注意开花期不能打药，会影响授粉。



山西省太原市读者张宝玉问：

可以在红薯地里套种辣椒吗



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌金薯种业科技有限公司高级农

艺师朱渭兵说，红薯地不宜套种辣椒。由于两种作物共生期长，在水肥管理

上差异较大，而且辣椒遮光不利红薯生长，也不利田间管理操作和收获。

陕西省榆林市读者雷俊问：

牛犊鼻子、眼睛红是怎么回事



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，牛犊眼睛红是眼结膜充血或发炎。鼻子发红，如果是外面

黏膜发红，或是局部炎症，或是全身其他问题。如果有体温升高、精神沉郁、食欲不振、咳嗽、腹泻等症状，就需考虑是否得了全身性疾病。如果没有上述全身性症状，那就是局部结膜炎、鼻炎或局部皮肤、神经的炎症。处理时首先翻开上下

眼睑，检查有无沙粒等异物并冲洗掉，使用氧氟沙星眼药水或其他抗生素眼药膏，每天使用3-4次。如果是鼻炎，可以使用鼻炎喷剂、鼻腔喷雾或小浓度消毒液冲洗鼻腔。如果是鼻腔外边皮肤问题，可以涂抹皮炎平等药物。

陕西省延安市读者白雅安问：

小鸡站不稳、似要跌倒，但能吃能喝、粪便正常是怎么回事



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说，从你描述的情况来看，鸡出现站立不稳、倒

退、似要跌倒等症状，一般为鸡新城疫神经症状，属于遗传性疾病。雏鸡越紧张，该表现就越严重。雏鸡自身带毒，可以慢性传染给其他

鸡。这是鸡群中的个别现象，可以口服病毒灵片1粒/次，2次/日，维生素B1片1粒/次，2次/日，以上均连续饲喂3天。

陕西省渭南市读者陈田问：

枣树种植后该怎样追肥



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级农艺师曹卫贤回复说，枣树追肥，重点抓好以下几个时期：

枣春肥：又称萌芽肥，通常在枣树发芽前施用，肥料以速效氮肥为主。施肥时间在3月下旬至4月中旬，每亩10-15公斤尿素或者

40-50公斤碳酸氢铵。

枣夏肥：也叫坐/膨果肥，坐果期以磷钾肥为主，适当配施氮肥。施肥时间可分为枣夏前和早秋前两个时期。每亩用磷酸二铵20公斤、尿素10公斤、氯化钾15公斤左右，或者用含氮磷钾含量分别为15-15-15的通用型复合肥

料40-50公斤。每次施肥后都要配合灌水。

为了提高保花保果效果，在进行常规水肥管理的同时，还应在枣树开花前期和幼果期叶面喷施1%的尿素、0.1-0.25%的硼砂和0.2-0.3%的磷酸二氢钾，每隔7-10天喷肥一次，连喷3次。

湖北省武汉市读者李辉问：

植物杀虫剂和杀菌剂可以混合使用吗



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，杀虫剂大部分是酸性的，可以与非碱性的杀菌剂混用，但也有不宜混用的情况：

一是酸碱不合；二是药剂特性，如噻菌酯不能与乳油、有机硅混用；三是靶向不同，比如麦田杀虫剂喷施麦苗，除草剂喷施杂草叶面，不宜混用；四是互相拮抗，互相减效；五是药剂间有不

良反应，如两者混合会产生化学反应，导致变性、沉淀、燃烧、爆炸等；六是铜制剂最好不与其他农药混用，以免发生置换反应。总之，使用产品一定要注意产品说明书的禁忌事项。

(本版内容由赵思懿整理)