



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码 咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段：

每周一至周五 上午9:00-12:00 下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学研究员

李省印

西北农林科技大学研究员

花蕾

西北农林科技大学研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

陕西省三原县读者李江河问：

适合三原地区种植的高产玉米品种有哪些



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，农作物品种具有较强的区域性，应该根据玉米品种区域试验结果确定当地最适宜种植的品种，目前陕西省、咸阳市还未发布2023年玉米品种布局意见，参考2022年陕西省

玉米品种布局意见，夏播种植可选择郑单958、秦龙14、秦龙998、陕科6号、陕单609、中科4号、兴民18、中科11、户玉3513等稳产品种；也可以选择陕科10号、天赐19、榆单2275、金科玉3306、万瑞5号、陕单808、壳盛501、西农2580等新审品种。机收籽

粒可选择陕单650、陕单659、秦龙810、秦龙807、陕单660、陕单809、榆玉9号、伟隆209、延科9号、榆单896等优良品种。青贮玉米可选择兴民3388、秦鑫630、秋润100、兴民28、华亦1204、大唐12、登峰705、铁研53等品种。

山东省寿光市读者尹一泽问：

菜心的采收标准是什么



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说，菜心的商品要求为：品质脆嫩，色泽青绿，蔓

叶少而细小，节间长，菜薹粗细适中，横径1.2-1.8厘米，高度不超过20厘米，新鲜洁净，无病虫害。采收标准是：采收“齐口花”，

是以菜薹的高度和薹叶的先端齐平，初现花蕾俗称“齐口花”为适期，这时质量较佳，从植株基部留2-3节切下菜薹。

河南省郑州市读者吴庆天问：

辣椒生长前期顶部发黄、逐步枯萎，怎样管理



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说，根据情况描述，疑为农药

或激素药害。建议叶面喷施“碧护”，亩用“碧护”7克，兑水30公斤，均匀喷雾，每5-7天喷1次，连喷3次，解

除药害。加强水肥管理，冲施或滴灌黄腐酸类肥料促根，以缓解害状，促进生长。

湖北省黄石市读者周超问：

蛋鸡食物中毒，怎样医治



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说，可以采取以下方法治

疗：1.口服维C片，每次1/4片，2次/天。2.口服制霉菌素50万IU，每次1/4片，2次/天。3.病鸡注射氟苯青霉素

1.5万单位+地塞米松5毫克/支(0.3毫升)，2次/日。4.饮水加入黄芪多糖+电解多维，饮用2-3天。

陕西省西安市鄠邑区读者廖东平问：

葡萄叶缘干枯，原因有哪些



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员冯存良回复说，葡萄叶缘干枯原因较多：1.遇到高温干旱，冷棚或避雨棚栽培会严重发生；2.地面

遭遇涝害或土壤板结，长期处于不透气状态，根系缺氧；3.施肥种类、施肥量、施肥方法不当，发生肥害；4.褐斑病、根部病害和药害也会引起叶子边缘干枯。



福建省福州市读者陈晓静问：

向日葵除草剂如何选择



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级农艺师曹卫贤回复说，除草剂按作用方式分为选择性除草剂和非选择性除草剂(灭生性除草剂)。选择性除草剂在植物间有选择性，能够杀死某些植物，而对另外一些植物相对安全；灭生性除草剂在不同植物间没有选择

性，即对所有植物有毒害或抑制作用，如百草枯、草甘膦等。

适用于向日葵的为选择性除草剂，常用的种类有5%精喹禾灵乳油、乙草胺、精异丙甲草胺等。按除草剂喷洒的目标分为土壤处理剂、茎叶处理剂。土壤处理剂是指除草剂喷洒到土壤表面，以杀死未

出土杂草；茎叶处理剂是喷洒到杂草茎叶上起作用的除草剂。土壤处理法包括播前土壤处理、播后苗前土壤处理和移栽后土壤处理。目前，覆膜向日葵和向日葵种植大户多采用播前处理法，或播前处理法与茎叶处理法相结合来灭除田间杂草。

陕西省宝鸡市读者汪洋问：

喂鸽子玉米时，需要用水泡吗



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说，鸽子以谷

类食物作为身体能量的主要来源，大米、小麦、玉米、荞麦等都是鸽子喜爱吃的食物。在饲喂玉米

时，要供给干物质(干玉米)，喂食器旁放置清洁的水源让鸽子自由饮用。

(本版内容由赵思懿整理)