



码上看报



码上订报

农业科技报 全媒体出品



扫二维码 咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段：

每周一至周五 上午9:00-12:00 下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学研究员

李省印

西北农林科技大学研究员

花蕾

西北农林科技大学研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

陕西省西安市鄠邑区读者宋倩问：

葡萄变黑掉果怎样处理



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员冯存良回复说，出现以上情况，疑似葡萄黑腐病。防治方

法：1.使用70%甲基硫菌灵可湿性粉剂（低毒）1000倍液喷雾。安全间隔期21天。2.使用30%戊唑·多菌灵悬浮剂（低毒）800-

1200倍液喷雾。安全间隔期10天，每季最多用药2次。3.使用250克/升啞菌酯悬浮剂（低毒）800-1200倍液喷雾。

安徽省阜南县读者刘道远问：

驴驹多大时断奶



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，一般小驴驹的断奶时间在5-6个月之间。

病（精神良好、呼吸平顺、食欲旺盛、粪便成型）；2.气候平稳；3.饲草饲料不发生改

变。断奶方法：一是提前10天，做好母子分离准备，前3天每天母子合养3次哺乳，每次40-60分钟；中间3天每天两次合养哺乳，每次20-30分钟；后3天每天一次母子合养，每次不超30分钟。二是在计划断奶日将母子直接分离，加强对小驴驹的观察与细心照顾。

断奶注意事项：1.小驴驹健康无

断奶方法：一是提前10天，做好母子分离准备，前3天每天母子合养3次

甘肃省成县读者李华腾问：

核桃树需要预防哪些病虫害



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学冯存良研究员回复说，核桃常发的害虫有100多

种，病害有20多种。目前核桃产区发生的主要虫害为八虫六病。虫害有金龟子、核桃举枝蛾、核桃小吉丁虫、

木撩尺蠖、天牛、核桃缀叶螟、舞毒蛾、黄刺蛾；病害有黑斑病、炭疽病、褐斑病、枝枯病、腐烂病、白粉病。

山东省寿光市读者张正问：

生菜有麻点，疑为叶斑病，怎样防治



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说，叶斑病发病时从叶缘开始，随着病情发展，斑点会逐渐扩散，而且这些斑点上还会覆盖着黑色的小

颗粒，这些颗粒就是叶斑病的病原体，在病情严重时会导致整个植株染病。

抗性。发病初期喷施75%百菌清可湿性粉剂1000倍液加70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液，或者选用苯醚甲环唑或吡唑醚菌酯等，隔10-15天轮换一次，连续防治1-2次。

防治方法：注意摘除病叶及病残体，携出田外烧毁。施用有机肥，配合磷钾肥，避免偏施氮肥，培养壮棵，增强

陕西省汉中市读者吴一迪问：

雏鸭鹅腿软站立不起，怎样治疗



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说，雏鸭鹅腿软站立不起病因复杂，主要有病毒因素、细菌因素、营养性及自身代谢与外伤因素。一般在30日龄以内，鹅副粘病毒、流感病毒等侵害神经系统就会引起腿软无力或

站立不起。所以，用户应当明确鸭鹅购买以前是否做过相关免疫。浆杆速康是主治大肠菌浆膜炎药物，也可更换药物结合抗病毒（鹅副黏病毒）进行。可选用病毒灵片1/2片/次，2次/日；或环丙沙星1/4片/次，2次/日。氟苯尼考饮水，按说明剂量用。



河南省焦作市读者蒋翼遥问：

莫西虫净驱虫效果如何



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，

莫西虫净是由两种光谱驱虫药伊维菌素和阿苯达唑组成。二者都是使用多年、成熟可靠的

驱虫药。二者相互补充，驱虫谱更广，更加安全高效，农户可以放心使用。

四川省凉山彝族自治州昭觉县读者李志毅问：

黄芩死苗现象严重，原因有哪些



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授王渭玲回

说，黄芩发生死苗现象，原因有很多种。一是地下害虫为害。二是土壤问

题，酸碱度不合适或者土壤有毒性物质造成死苗。三是干旱或者积水原因。

山西省太原市读者刘明问：

怎样防治洋葱白腐病



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，防治洋葱白腐病，有以下措施：

1.种植洋葱时要注意实行3-4年轮作。2.种植期间要及时清理田间病株和病残物。3.播种前将葱种用50%速克灵（腐霉利）或50%扑海因（异菌脲）可湿性粉剂1000倍液浸种20分钟。4.洋葱生长期按包装喷

雾浓度选用啞霉胺、醚菌酯、苯醚甲环唑、菌核净、乙烯菌核利、甲基立枯磷等进行灌根，以控制蔓延。由于病菌在地下根与假茎处为害，所以喷雾效果不佳。