



码上看报



码上订报

数字身份、配制科学餐、自动喂食……

这里的鸽子住上“小洋楼”

近日,位于河南省舞钢市枣林镇铁炉王村的天成鸽业公司省级现代化农业产业园内,一栋栋新建成的双层楼房里,数万对脚戴专属蓝色铁环“身份认证”的鸽子或悠闲踱步,或振翅欲飞,或咕咕向母鸽求爱,“咕”声嘹亮,犹如演奏着一曲幸福乐章。

鸽业公司的一排排多层立体化鸽笼里,都有两条智能化输送带:一条负责定时投喂精心配制的“鸽餐”饲料,另一条则

将鸽子产生的粪便及时传送出去,进入收纳设备。偌大的鸽舍里整洁明亮,闻不到丝毫的异样气味。

“这一批鸽子是2022年住上‘小洋楼’的。目前,12座双层洋楼鸽舍全部按照自动化、智能化标准建设并进行养殖,每层都设有通风装置和日照补光,不仅节省了养殖成本、提高了生产效率,更关键的是,鸽子能充分沐浴阳光,保持‘心情愉悦’健康绿

色成长。”天成鸽业公司董事长杨明军说,养殖场同时还配备了饲料加工、消杀补光、喂养清粪等先进智能设备,从鸽子下蛋到破壳全部采取智能化温箱孵化,“目前已完全实现了生产标准化、防疫设施化、养殖良种化的健康科学养殖。”

专注养鸽近30年的杨明军,目前已先后培育出了“天成王鸽”等13个肉鸽良种品系和30万对核心种群,而他的拥有

“世界十大名鸽”称号的天成鸽业公司,已先后与国内30多个省市的近9000家鸽业养殖企业建立了合作关系。

“一鸽俊更要百鸽舞”。位于该市尚店镇的舞彩肉鸽养殖专业合作社,是在天成鸽业公司辐射带动下新成长起来的一家鸽业养殖及销售的新型农业企业,目前已发展标准化鸽舍8栋,养殖种鸽1万余对,月产乳鸽1.5万只,经济效益和社会效益初步

显现。

现如今在舞钢市,小鸽子已“长”成大产业。截至目前,据不完全统计,该市养鸽特色产业已覆盖10个乡镇(街道),有天成鸽业、物华天宝鸽业、舞彩鸽业、翔跃鸽业等22家养鸽企业和8家养鸽合作社,存栏种鸽110万对以上,年繁育种鸽60万对,出栏乳鸽1500万只、生产鸽蛋1200万枚以上,鸽业年产值近10亿元。(据人民网)

蛋价跌破4元/斤 三季度或达高位

近日梅雨季,鸡蛋主产区多地均价跌破“4元关口”,月内降幅超10%。据了解,目前蛋鸡养殖已由盈转亏,不过后续中秋节及学校开学备货提振,鸡蛋需求有望好转,8-9月或能达到年内高位水平。

主产区河北省蛋鸡养殖户表示,端午节前河北价格就已经跌破4元,主要在于市场消费低

迷,学生陆续放假后,学校集中采购鸡蛋需求变差,端午、中秋和春节前一般销售鸡蛋礼盒,销量高,价格贵,但是节日过后走量一般。

业内人士表示,南方梅雨天气导致鸡蛋运输和存储难度增大,霉蛋、问题蛋较多,贸易商拿货谨慎,市场行情较为清淡。

蛋价持续下跌,养殖利润由盈转亏。上海钢联农产品事业部鸡蛋分析师王芳表示,近期饲料价格小幅提升,当前产一斤蛋的饲料成本在3.72元/斤,加上人工、水电、折旧等费用,单斤养殖成本在4.12元/斤。而目前全国鸡蛋主产区均价在3.95元,当前的养殖亏损在0.16元/斤左右。

王芳推算,三季度在产蛋鸡存栏量呈递增趋势。考虑到7月中旬开始北方进入三伏天,受高温影响鸡蛋进入歇伏期,采食量将减少,产蛋率亦下降5%-7%,三季度鸡蛋产量或低于预期值。预计三季度鸡蛋市场将迎来季节性旺季,蛋价或持续上涨。

(张晨静)

夏季养猪增重的管理技巧


多喂清热泻火的饲料。常见的清热泻火饲料和添加剂有麦麸、豆饼、花生饼、人工盐、南瓜及去火增食剂等,生产中可根据条件任意选用、添加。高粱、瓜干和酒糟等热性饲料尽量少喂。

供给清洁的饮水。夏季,猪的饮水量增多,其中哺乳猪和仔猪的需水量更大,所以夏季养猪最好喂稀食,并在圈内放上水盆或水槽,随时供应清洁的饮水。在高温情况下可以在猪圈内挖一个坑,坑内灌足凉井水,供猪打泥用,但切不可将凉井水直接泼到猪身上。

驱除蚊蝇。夏季,蚊蝇滋生会影响猪休息,并污染饲料和饮

水,传染某些传染病。可以夜间在猪圈内点燃蚊香或挂上用纱布包好的晶体敌百虫,以防蚊虫叮咬,还可定期给猪吃适量的畜用土霉素,并每天做好饲用器具的冲洗和猪圈的清洁工作,避免病菌传染。

夜里多喂食。夏季白天高温,严重影响猪采食,所以应在夜间和温度较低时在圈内放足猪饲料,以利于猪增重。可以在晚7点、夜间11点、凌晨4点各喂一次饲料,在上午10点和下午2点半各喂一次0.5%的食盐水。饲喂数量如下:猪体重在达到35公斤之前每天喂食2公斤,饮盐水2公斤;猪体重在35-60



公斤时每天喂食2.75公斤,饮盐水5公斤;猪体重在60公斤以

上时每天喂食3.5公斤,饮盐水7.5公斤。(江农)

炎热夏季如何贮存饲料

夏季雨水多、气温又高,空气相对湿度较大,加上真菌、细菌等微生物的作用,饲料及其原料在贮存过程中容易发生氧化、结块发霉,导致营养物质损失,造成浪费。

正确选择贮存地点

饲料贮存仓库必须选择地势高、干燥、阴凉、通风良好且排水方便的地方,四周墙壁及地面用水泥抹好,以防漏、防鼠和防止地面返潮。贮存仓库清扫干净后关闭门窗进行熏蒸消毒,盛放饲料的包装要用高温水蒸气消毒。料缸和料桶用1:3000的百毒杀溶液消毒,存放时饲料不能和地

面墙壁直接接触,要用木板支架隔离开。

控制好饲料和原料的含水量

饲料及原料的含水量高低直接关系到饲料的贮存效果,水分高,饲料易发热氧化、结块霉变。据试验,饲料含水量在15%以上最易发生霉变,而且随水分含量增加饲料霉变速度也相应加快。因此,贮存时应严格控制饲料含水量在安全范围内。

控制好温湿度,加强通风

低温、低湿和良好的通风条件有利于饲料的贮存,能防止饲料氧化、发霉。一般来讲,饲料

贮存室内相对湿度要低于60%,并保持良好的通风换气,尽可能降低贮存室内温度,有条件的可安装温度表和湿度计,以便于及时检查。相反,高温、高湿则不利于饲料的贮存。据试验,气温在10摄氏度以下时霉菌生长繁殖缓慢,气温在30摄氏度以上,且湿度适宜时霉菌会迅速繁殖,饲料内霉菌数量大增,从而造成饲料发霉变质。

饲料存放及安全贮存期

饲料贮存时间较长时,应定期检查,及时上下翻动和通风换气,发现饲料或原料发热及时摊开散热,受潮或发热的饲料应马上使用或分开贮存,防止其余饲

料结块、霉变。使用时,应遵循先陈后新的原则,不可新旧饲料混用。此外,由于夏天气温高且湿度大这一特殊原因,一次购料、配料不宜过多,饲料或原料也不要贮存太久,散装料以3天左右用完为宜,袋装料最好不超过7天,最迟也应在10天-12天内使用完。

应用高效饲料防霉剂

尽管饲料或原料经过干燥处理,但其中总是含有一定数量的霉菌。一旦条件适宜,它们就会迅速生长繁殖,造成饲料霉败,所以防霉是夏季饲料贮存工作的重点。

(据《吉林农村报》)

学会给羊喂药打针

羊在防病治病中用药多采用注射、直接喂服方式给药,一般不采用饮水、拌料方式给药。

抓羊方法

抓羊应抓羊腰背处皮毛。注意不可直接抓腿,以防扭伤羊腿;不可将羊按倒在地使其翻身,因羊肠细而长,这样易造成肠套叠、肠扭转而引起死亡。羊抓住后,人骑在羊背上,用腿夹住羊前肢固定,便可喂药打针。

喂药方法

液体药。将药物装入塑料瓶或长颈酒瓶内,抬高羊头呈水平状,一手拿灌药瓶从羊的一侧口角插入,稍向一侧颊部推入,然后将药液倒入。药量大时倒入部分药物后稍停,让羊吞咽下再倒。

片剂药。用手抬高羊头呈水平状,另一人用手从一侧口角插入让羊张嘴,将药片投入口中,让其吞咽。

打针方法

肌肉注射。在羊的颈上部1/3处(肩胛前缘部分),先用碘酒局部消毒,注射时,用左手拇指、食指呈“八”字形压住肌肉,再推药液。注射完毕,拔出针头,针孔用碘酒消毒。

皮下注射。先用碘酒消毒羊颈部,用左手拉起皮肤成三角形皱壁,右手拿注射器将针头刺入皮下,如针头能左右自由活动便可推入药液。注射完后拔针,对针孔用碘酒消毒。

静脉注射。静脉注射部位为羊耳部或颈部,剪除注射部位羊毛,碘酒消毒,用手拍打静脉,将针头刺入顺血管平推,如有血液回流入管,则可慢慢推入药液,注射完后消毒针孔。(张玉成)