




码上看报



码上订报

农业科技报 全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五 上午9:00-12:00 下午3:00-6:00

坐诊专家

(排名不分先后)

谢恩魁

西北农林科技大学教授

常宗堂

西北农林科技大学研究员

李省印

西北农林科技大学研究员

花蕾

西北农林科技大学研究员

黎九州

杨凌职业技术学院副教授

史瑞仁

杨凌职业技术学院高级兽医师

谷撑贤

杨凌职业技术学院高级兽医师

陕西省榆林市读者张桓问:

### 奶山羊可以喂整玉米粒吗? 能用伊维菌素驱虫吗



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,奶山羊不能喂整粒玉米,其消化利用率极差。应将玉米粒破碎或压扁喂

羊,才能达到最佳饲养效果。

泌乳羊不能使用伊维菌素驱虫。虽然不影响产奶量,但驱虫药都有一定的毒性,一是会直接影响哺乳羔羊的生长发育;二是

伊维菌素在羊体内代谢较慢,会影响羊奶风味,令人口感不适;三是制成的奶粉对婴幼儿身体发育不利。因此,奶山羊在泌乳期禁止使用伊维菌素驱虫。

山东省德州市读者张文华问:

### 黄瓜瓜条颜色浅 如何缓解



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说,黄瓜瓜条发白,有可能是白粉病。如果不是,那么主要原因一般有两个:一是高温,二是黄瓜扎根了。如果棚里黄瓜基本上都发白,主要是高温

导致,如果个别棵上瓜条发白,多是黄瓜扎根了。

解决方法:遮阳降温,如喷洒降温剂或覆盖遮阳网等,高温天中午前后及时喷水;注意检查植株,如果黄瓜扎根,要及时断根,嫁接苗建议选用南瓜根系。



四川省成都市读者王万山问:

### 拱棚圆茄幼叶背面呈紫红色,是缺磷吗? 可以冲施磷酸二氢钾缓解吗



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说,如果茄子缺磷,可以冲施磷酸二氢钾进行补充。但是经过了解,由于该菜农基肥施用复混肥、

随水冲施的大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料中含水溶磷含量均较高,基本可以满足茄子生长需要,几乎不会出现缺磷现象。那么,茄子叶片出现紫红色,应注意从土壤速效钾含量高、唑类

农药频繁使用、生长调节剂用量大、“添加色素”肥料长期使用影响花青素或色素合成、降解等因素方面加以分析和探讨,建议菜农根据实际情况采取合理的措施进行缓解。

陕西省府谷县读者问:

### 九月份玉米管理注意啥



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平说,当前府谷玉米正处于植株高大、田间郁闭的产量形成关键期,田间环境有利于病虫害的发生。根据府谷县农

业技术推广服务中心预计,下阶段玉米病虫害总体将中等发生,草地螟、三代粘虫重发威胁小,二代玉米螟等穗部害虫发生危害程度重于上年。这段时间雨水多、湿度大,对玉米红蜘蛛和蚜虫

有一定控制作用,但有利于后期病害扩展流行。种植户要注意田间查看,及时采取科学措施防治玉米螟、棉铃虫等玉米穗期病虫。同时,注意查看、防控玉米锈病、大斑病、茎腐病的发生。

河南省洛阳市读者尹峰问:

### 怎样防治大豆病虫害



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,病虫害对大豆的生长危害很大,严重时减产损失可达30%以上。大豆的病害主要有大

豆根腐病、线虫病、灰斑病、褐纹病、霜霉病等,虫害有潜根蝇、大豆蚜虫、食心虫等。

防治办法:事前预防,选无病优良品种,整地时进行土壤灭菌杀虫处

理;在发病前喷施灭菌防虫药剂+新高脂膜800倍液,可有效预防病虫害发生;在病虫害发生期,要按植保要求喷施针对性药剂+新高脂膜800倍液进行灭杀。

陕西省周至县读者王华平问:

### 猕猴桃果园怎样防控蟋蟀



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员陈永安回复说,一是控制果园杂草数量和高度,适当刈割或适当使用化学除草剂清除果园杂草,破坏蟋蟀栖息繁衍生存环境。二是蟋蟀昼伏夜出,具有隐蔽

特性。在园间或地头设置4-5堆5-15厘米厚的草堆,诱集集中捕杀。

三是毒饵诱杀,制作诱饵(50%敌百虫晶体:水:炒香麦麸皮=1:5:100),从8月中下旬开始每亩施用该拌药麦麸皮5公斤,撒施于树冠下周围。

四是在清晨或傍晚可选用7.5%氯氟·吡虫啉悬浮剂或12%噻虫嗪·高氯悬浮剂1500-2000倍液等全园喷药。选用安全高效低残留优质农药,并注意农药使用安全间隔期,将药剂残留量控制在标准范围之内。

(本版内容由赵思懿整理)