



码上看报



码上订报

农业科技报® 全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

湖北省襄阳市读者孙超问: 怎样种植金线莲



答:杨凌老科协专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,可以参考以下方法种植金线莲。

1. 选择土壤。金线莲适合生长在疏松肥沃、排水性好、富含腐殖质的土壤中。

2. 分株种植。将准备好的植株移植到盆土中,浇透水,将花盆放置于阴凉通风处,避免强光直射。

3. 环境温度。金线莲不耐寒,生长温度必须维持在25℃-30℃之间,冬季要注意防冻,夏季温度高时需降温。



山西省运城市读者田柳问:

大棚豆角叶片和豆荚上都有红色病斑,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级农艺师曹卫贤回复说,根据描述,豆角可能发生了炭疽病。该病发病时,豆角叶片和豆荚上都会被侵染,出现红色的

病斑,开始病斑较小,随后病斑逐渐变大、近圆形。叶片发病时,叶脉也会变成红色,豆荚上病斑凹陷,严重时能穿过豆荚皮而扩展至种子。

建议菜农及时喷施醚菌酯、炭疽福

美、多菌灵等进行防治。需要注意的是,豆类作物比较敏感,选用药剂的种类不要太多,一般1-2种即可,浓度不要随意加大。有些药剂在豆类作物上要慎用,避免造成药害。

重庆市梁平区读者张晴丹问:

冬季气温低,大棚蜂箱如何保温



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院研究员黎九洲回复说,可参考以下方法为蜂箱加温。

加泡沫箱。如果棚内最低温度为10℃时,需做好保温措施。找一

个有盖子的泡沫箱,把蜂箱放进去,然后盖上盖子。注意要在泡沫箱的四面挖几个洞用来通气。

加棉被。如果棚内夜间温度低于8℃,需要给蜂箱加透气性比较好的棉被进行保温。如果棚内夜间温

度低于5℃,需要晚上把蜂箱搬出大棚,放到比较暖和的房间里面,等到第二天早上再把蜂箱放到原来的位置。摆放熊蜂时,一定要在蜂箱的顶部加遮阳板,防止阳光直射,同时防止水滴打湿蜂箱。

山东省潍坊市读者李丹问:

西红柿茎秆上部出现水浸状黑色坏死斑,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员常宗堂回复说,应该是西红柿晚疫病。晚疫病在湿度大、温度适宜的条件下,

发病速度较快。管理时,注意控制棚内湿度,浇水后及时通风,并适当减小浇水量。发病初期,建议适量喷酒烯酰吗啉或霜霉威盐酸盐或银法利等药剂进行防治。



河北省承德市读者蔡金山问:

黄瓜中上部叶片有黄绿斑驳现象,怎样解决



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级农艺师曹卫贤回复说,出现以上情况,应该是花叶病毒病。

大棚黄瓜出现以上情况时,应把很明显的毒株拔掉带出温室,以防整枝落蔓造成人为传播。当前注意浇水,预防好烟粉虱、蚜虫、蓟马和螨

虫。可用几丁碳酶,或盐酸吗啉呱加宁南霉素加细胞分裂素,或氯溴异氰尿酸或高锰酸钾喷雾加灌根。最好交替用药,喷施3-5次为好。

甘肃省庆阳市读者汪新宇问:

断奶仔猪呕吐、拉稀、消瘦 用抗菌药物治疗效果差,该怎么办



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,可能是猪轮状病毒病,需通过实验室检查才能确诊。猪轮状病毒病是猪的急性肠道传染病,以厌食、呕吐、腹泻、脱水、体重减轻为主要特征。本病多发生于晚秋、冬季和早春。

该病无特效治疗药物,如确定为该病,只能辅以对症治疗。发现病猪立即停止喂乳,以葡萄糖盐水或复方葡萄糖溶液给病猪自由饮用。主要依靠加强饲养管理,增强猪的抵抗力。在流行地区,可用轮状病毒佐剂灭活苗或猪轮状病毒弱毒双价苗对母猪或仔猪进行预防注射。油佐剂苗于怀孕母猪临产前

30天,肌肉注射2毫升;仔猪于7日龄和21日龄各注射1次,注射部位在后海穴(尾根和肛门之间凹窝处)皮下,每次每头注射0.5毫升。弱毒苗于临产前5周和2周分别肌肉注射1次,每次每头1毫升。同时要使新生仔猪早吃初乳,接受母源抗体的保护,以减少发病和减弱病症。

陕西省乾县读者周昆明问:

大葱叶片有白色的条状斑点,比较稀疏 另有大葱叶片变灰白色,怎样解决



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,大葱叶片上稀疏的条状斑点,应是蓟马

危害造成的,应抓紧防治蓟马,配方有啮虫脒或噻虫嗪或艾绿士,以上任何药剂都可配上高效氯氟氰菊酯喷雾防治。

大葱叶片灰白色应是霜霉病,可喷施甲霜灵或烯酰吗啉或银法利,结合喷施蓟马药剂兼防兼治。注意雨后和傍晚后喷施效果良好。

(本版内容由赵思懿整理,仅供参考)