



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五 上午9:00-12:00 下午3:00-6:00

陕西省安康市读者赵长春问:

### 鸡舍喷水 有哪些注意事项

答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,舍内干燥,往鸡舍洒水有一定的好处,可以调节鸡舍湿度,减少鸡舍内的灰尘和毛屑。不同日龄的鸡对湿度的要求不一样,湿度低的时候就需要洒水增加湿度,湿度高的时候就不要洒水,如果造成湿度过大,反而容易导致鸡生病。洒水时可以加入一些消毒液,既能为环境消毒,也能带鸡消毒。冬季洒水时,一定要为鸡舍升温。带鸡消毒时,要避免疫期。

河南省郑州市读者牛洛问:

### 彩椒果实出现黑斑,有水渍状晕环,是怎么回事



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,这是细菌性疮痂病。细菌性病害都是通过伤口侵染,早晨果实表面较为潮湿,如果通风不当很容易导致果实皴皮,利于细菌性病害的侵

染。菜农要注意合理通风,降低棚室内的湿度,同时,喷洒氯溴异氰尿酸、噻唑锌、铜制剂等药剂进行防治。

辽宁省丹东市读者吴兴发问:

### 番茄植株上部的叶片呈紫红色,怎样改善



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员仵均祥回复说,番茄叶变紫红是低温季节蔬菜上经常发生的问题,这主要与磷元素的缺乏

有关。植株出现缺磷症状,可能有两个原因:一是土壤中的磷元素不能顺利被根系吸收,二是土壤中缺磷。另外,低温或根系生长不良,也会影响根系对磷的吸收。

当番茄出现缺磷症状后,最为直接有效的措施是叶面补充,可定期喷洒磷酸二氢钾,能有效补充磷肥。追肥时使用一些磷含量高的肥料。低温季节,要注意提高地温,增强根系的活力。

湖北省黄冈市读者李青州问:

### 茄子表皮及髓部水烂,有臭味,什么原因



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,根据描述判断,这应该是细菌性病害侵染

导致。防治茄子烂秆,可以“喷药+涂抹药剂”结合进行。菜农可以喷洒氯溴异氰尿酸、噻菌铜、噻唑锌等药剂进行预防。

当发现烂秆已经开始发生时,菜农可将上述药剂调成糊状采用涂抹法进行防治。同时,要注意降低棚内的湿度,尤其是浇水后要及及时通风排湿。

陕西省延安市读者王冰问:

### 喂牛青贮料注意啥



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,青贮饲料可以

作为纤维素饲料与精料合理搭配饲喂,但必须在厌氧的环境中保存,变质的青贮饲料禁止饲喂。冬季青贮窖上层青贮料容

易结冰,冰冻严重的青贮饲料禁止喂牛。在饲喂过程中,应同时在补饲槽中添加适量的小苏打。

甘肃省天水市读者孙志峰问:

### 家兔风寒腹泻,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,家兔风寒腹泻,治疗时宜祛风散寒、健脾止泻,处方为:  
1.乌梅、厚朴各10克,黄连、神曲各6克,甘草8克,山楂12克,桂枝5克,共水煎

加糖适量混合灌服,每只每次服10-15毫升,每日3次,连用2-3天。  
2.白术、滑石各12克,藿香、白头翁各10克,干姜、茯苓各8克,黄连、甘草各6克,共用水煎成浓药液,加糖少许混合内服,每只每次服15毫升,每日1次,连用3天。



江苏省常州市读者展辉问:

### 连续喷施2次药肥后 全棚辣椒叶片布满白色斑点,是药害吗



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员仵均祥回复说,根据描述判断,这是喷药不当导致的药

害。在防病治虫时,菜农应尽量少混配农药,喷药宜选择在晴天进行。药剂喷洒完毕后,要保证足够的通风时间,使药液既浸润叶片,又使水分蒸发

的时间不过长和过短,才能达到最佳的防治效果。一旦出现药害,菜农可及时用清水淋洗叶面,并喷洒功能型叶面肥缓解叶片的受害症状。

甘肃省天水市读者王宇问:

### 草莓灰霉病怎样防治安全高效



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,可以按照“物理+化学”的方法防治草莓灰霉病。

个灭菌灯防控面积30-40平方米,每天上午进棚前或傍晚扣棚后开灯5-8分钟,消灭空气中的病菌孢子。

烟剂进行防治。

物理防治:

- 1.上茬作物采收结束后,彻底清除病残落叶,并进行无害化处理。
- 2.草莓定植前高温闷棚,栽植前可选用硫磺或百菌清烟剂消毒,或硫磺熏烟消毒,降低病菌基数。
- 3.棚室内安装设施大棚灭菌灯,一

4.提高田间管理水平,降低棚室湿度;合理密植,及时摘除残枝病叶,烧毁或深埋;加强通风透光,尽可能提高光照水平和通风透光条件;平衡施肥,不要过量施用氮肥,进行田间调查和监测,及时进行化学防治。

化学防治:

1.针对棚室湿度大,易于病害流行的问题,可以选用百菌清或腐霉百菌清

2.发病初期喷施3%多抗霉素水剂600-900倍液,或醚菌酯·啶酰菌胺悬浮剂600-1000倍液,或30%氟菌唑可湿性粉剂2000倍液,或50%甲基硫菌灵300-400倍液,或40%啞霉胺悬浮剂1200倍液,或50%咪鲜胺可湿性粉剂1000倍液,或50%腐霉利可湿性粉剂1000倍液,或65%甲硫乙霉威可湿性粉剂800倍液喷雾,隔7-10天喷一次,连续喷2-3次。

(本版内容由赵思懿整理,仅供参考)