




码上看报



码上订报

农业科技报 全媒体出品



扫二维码，咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段：

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

江苏省南京市读者秦华问：

丝瓜烂瓜如何缓解

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员仵均祥回复说，这主要是细菌性病害侵染引起的。在生产中，这种情况一般是阶段性发生，连阴天气、浇水后棚内湿度比较大时蘸瓜容易发生。

缓解建议：1. 浇小水，勤通风，降低棚内湿度；2. 及时喷施氢氧化铜、春雷霉素等细菌性药剂。



江西省乐平市读者易团飞问：

番茄茎基部腐烂，有白色菌丝，是什么病害



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，这应是番茄菌核病。菌核病的典型症状就是腐烂和白色菌丝体，时间长了就

会形成黑色的硬菌核。该病的发生主要与温湿度有关，湿度在85%以上，温度在15℃-28℃时容易发生，属于低温高湿型病害，随气流传播。可同时侵染茎秆、叶片和果实等，危害性很大。对此，菜农

在防治时，先要降低棚内湿度，通过加强放风，小水勤浇，覆盖地膜等措施；当菌核病发生后，要喷施防治灰霉病的药剂，如啶酰菌胺加异菌脲，喷雾和涂抹相结合。阴雨天可以用烟雾剂熏治。

重庆市读者韩晓君问：

西葫芦毛细根少、变褐色，植株先萎焉后死棵，如何防治



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，根据描述，这应该是萎焉死棵，和连续阴雨天气较多，浇水较勤、水量较大伤根有关。西葫芦的

根系含水量大，比较娇嫩，浇大水后土壤透气性差，影响了根系的正常呼吸，从而出现了沤根。对此，菜农可先将铺好的地膜掀到垄上，露出大部分的垄，促进水分快速蒸发，降低危害；由于当前西葫芦

植株较小，根系伸展范围小，还可以进行多次划锄，增加土壤透气性；选用硫酸铜钙、双霉·乙酸铜、恶霉灵等配合生根类产品进行灌根，间隔5-7天，灌根2-3次，效果更好。

陕西省汉中市读者韩颖问：

野鸡养殖需要什么样的环境



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，野鸡运动场地面应有一定的坡度，以利于排水。地面要平整，最好做成水泥地面，以便于清扫。运动场的四周可砌1.8米左右的砖柱，顶上及四周加上拦网，拦网可用铁丝网，或者用尼龙网代替，安装拦网时，可在四周砌起30-100厘米

高的矮墙基，再将拦网安装上去，这样既可延长拦网的使用年限，又使运动场整齐美观。

因为种鸡在交配前，都要雌雄分离饲养，所以至少要建两个鸡舍。同时，鸡舍内还应准备好食槽、饮水槽等。因为鸡很喜欢沙浴，可在运动场内设沙池（河沙、石沙均可），也可用大塑料盆装沙置于运动场，注意让沙保持清洁、干燥。



陕西省宝鸡市读者张克忠问：

水果黄瓜顶部叶片小而黄、发硬，怎么办



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员仵均祥回复说，这应是螨虫为害的症状。螨虫为害会

引起植株顶部叶片变硬、黄化等不良现象发生。当前，虽是低温季节，但棚内温湿度适宜，螨虫、蓟马等仍可全年发生。对此，菜农在管理中应注

意，一是及时喷洒阿维菌素或联苯肼酯或螨危等药剂进行防治。二是悬挂黄蓝粘虫板，可以随时观察害虫的发生情况。

陕西省安康市读者王晓伟问：

种植黄瓜用什么底肥比较好



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说，无论是种黄瓜或者是种别的作物，基肥一定要施用充足，因为温室越冬茬口时间比较长，现在种植到来年6月底拔园，半年多的生长期，养分需要

量大。目前，多数菜农习惯用鸡粪、鸭粪，有的腐熟有的不腐熟，有的鸡鸭粪含有大量的消毒剂或盐分，连续多次施用，出现的问题不少。作为比较好的基肥，应该以微生物菌肥为主，无论是枯草芽孢杆菌还是木霉菌、酵素菌，其基质大部分是腐熟好

的鸡鸭粪或牛马粪或豆饼和作物秸秆，这些东西不但增加了土壤有机质，并且养分全面，改良了土壤，培肥了地力，抑制了盐渍化，控制了土传病害，好处很多。这应是温室高效栽培和可持续发展的必然选择，具有广阔的前景和深远意义。

河北省邯郸市读者曹睿问：

鸡腿菇上常见的细菌性病害有哪些



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说，鸡腿菇感染细菌性病害后的主要表现为菌盖顶部呈黏糊状态、

菌柄基部及周边会有莫名的污染斑块等，腐烂现象不突出。一般来说，在生产中，鸡腿菇感染细菌性病害后症状表现比较轻。其原因有两个，一是覆土原因，细菌性病害难得

表现；二是感染细菌后真菌性病害会随之而来，而将细菌引发的问题掩盖。生产中出现的腐烂病多为细菌、真菌交叉感染造成的，而尚未发现单独细菌感染的病症。

(本版内容由赵思懿整理 仅供参考)