



## 生猪

**加强防寒保暖。**重点是母猪的产房和仔猪保育舍。要加厚垫草,并及时更换和添加干燥新鲜的垫草,保持栏内干燥。猪舍四周进行封窗堵洞,特别是门窗透风的地方要用塑料布、彩条布或旧包装纸加木条钉上,防止寒(贼)风进入,但应注意通风。适当增加猪只饲养密度,低温天气在同一圈舍内可比平常增加1/3的猪只。

**为乳仔猪提供热源。**采用火源、供暖设施设备等方式保温,增加舍内温度,并加热饮水供仔猪饮用。

**适当增加饲料能量。**怀孕母猪每头每天增加饲喂1公斤饲料,其它生猪(仔猪、小猪、肥猪、泌乳母猪)应充分供料,让其自由采食。也可在原饲料基础上增加10%~15%玉米、小麦、糙米等能量饲料或添加适量油脂,提高饲料能量浓度。

**加强饲养管理。**重点是加强乳仔猪的管理,防止冻伤、冻僵、冻死,让初生仔猪尽早吃好初乳,并加强仔猪的补料;勤清猪舍粪尿,尽量少用冷水冲洗,保持舍内干燥。

## 家禽



**做好禽舍保暖。**低温条件下,适当增加饲养密度,关闭门窗,加挂塑料布或彩条布、饮用温水和火炉取暖等方式进行防寒保温,使禽舍温度不低于3℃。

**适当增加饲料能量。**可在原饲料基础上增加10~20%玉米,并根据体重大小适当增加喂料量,气温每下降3℃度,每只鸡日喂料量可增加5克左右,气温回升后再逐渐恢复到原来的喂料水平。

**保持环境干燥。**要强化管理,保持禽舍内清洁和干燥,及时维修损坏的水槽,加水时切忌过多过满,严禁向舍内地面泼水等。

**处理好保温与通风的关系。**中午天气较好时,应开窗通风,既要保温,又要适当通风;及时清除禽舍内的粪便和杂物,尽量少用冷水清洗,保持适中的饲养密度,保证舍内氧气充足。

**备足饲料。**要求经常备足15天以上饲料,以及1个月以上的主要饲料原料。

我国大部地区持续低温

部分地区有雨雪冰冻天气

# 应对当前天气,畜牧业生产该怎么办

据中央气象台网站消息,未来一周,我国大部地区气温将持续偏低,最低气温0℃线将位于贵州南部、广西北部、江西北部一带,湖南、贵州、湖北东部和南部等地的部分地区有冰冻天气。为应对持续低温雨雪天气,保障畜牧业生产稳定,建议采取以下冰冻雨雪天气应对措施。



## 牛羊

**调整饲养方式。**将原放牧饲养改为舍饲圈养,确需舍外放养应选择在上11时至下午3时之间,并尽量减少野外放牧时间。

**做好栏舍防寒保暖。**圈舍应用塑料布或彩条布等封闭,关闭门窗,防止贼风侵袭;窗户的玻璃应保持干净,以利采光。犊牛、羊羔及分娩牛羊可在圈内生火取暖,有条件的农户可以安装红外灯取暖。

**适当增加饲料能量。**母牛每日补喂1~2千克精料,羊的精料供给量应比平时提高20%,同时可增喂青贮料、胡萝卜等多汁饲料,有条件的农户可喂给混合精料,适当添加一些骨粉和食盐。

**加强饲养管理。**在圈内铺上垫草。并做到勤换草、勤打扫、勤除粪,尽量少用冷水清洗,防止将冷水冲洗到畜体上,保持适中的饲养密度,保持舍内空气流畅。天气晴朗时,将牛放出舍外,并刷拭牛体,既可预防皮肤病和体外寄生虫病的发生,又能促进血液循环,提高抗寒能力。

**备足草料。**防止大雪可能产生的饲料饲草供应和运输困难,确保饲料供应。

## 家兔

**兔舍防寒保温。**封闭式兔舍的温度应保持相对稳定,尽量控制在10℃以上,晚上关好门窗,但白天要注意适当通风3~5小时,有条件的兔场可采取地暖、水暖和空调方式保持舍内适宜温度。半开放式兔舍,在寒潮来临前,应该提前用草帘或较厚的塑料布将兔舍侧面、顶部遮挡好,兔舍门挂好门帘,防止贼风侵袭,及时使用电暖器等生热设备增加兔舍环境温度,同时注意白天通风。而对于仔幼兔,应尽量使用暗窝,提前在产仔笼垫好干净的软稻草和少许兔毛,并保持干燥和定时更换,保证笼内环境舒适。不建议雨雪天气在外散养家兔,容易因受寒生病而死亡。长毛兔冬季剪毛毛根留长(2毫米以上),风雪天延长养毛期。

**科学饲喂家兔。**1.增加精料喂料,少食多餐。增加精料饲喂量,尽量补充1次夜间饲喂,并强化添加1次夜间饲草(0.5千克左右),饲料配方适当提高饲料能量水平。2.保证供给充足的温水。

每天管道更换新鲜井水4~5次,特别是晚上,尽量更换不少于2次,保证家兔晚间采食后饮水新鲜不冰凉。

**做好疾病防治。**雨雪天气,家兔特别是幼兔容易呼吸道、胃腹部受凉而发生鼻炎、肺炎等呼吸道和腹泻、便秘等消化道疾病。对于呼吸道疾病,在平衡保温通风和加强饲养管理的同时,兔群应该按规程免疫巴氏杆菌苗,用泰乐菌素、氟苯尼考等药物(如鼻炎一针灵、兔鼻炎康,按说明使用)进行提前注射预防,严重者难以断根且易传染多淘汰处理。对于消化道疾病,关键是保证饲料质量和精粗饲料结构,仔兔及时吃到初乳,过好断奶换料关,饲料要逐渐过渡、保持饲料及饮水清洁,无冰料和水;腹泻者硫酸庆大霉素注射1毫升/次,喂服乳酶生4~6片/次,1日两次,连续3天;便秘腹胀者,停食,给饮水,喂服硫酸钠5~6克/次或者蓖麻油加温水蜂蜜10毫升,1日1次,1~3日用药,可同时腹部按摩。