



码上看报



码上订报

农业科技报® 全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

陕西省宝鸡市读者郑智文问:

黄瓜生根剂使用过量,如何解决

答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,建议菜农冲施生物菌剂,叶面喷施海藻酸、丙酰芸苔素内酯、甲壳素等进行调节,以尽快解除危害,提醒菜农以后不管使用肥料还是农药等都要按照说明使用。



陕西省澄城县读者王澎问:

怎样防治桃树蚜虫



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说,防治桃树蚜虫,需采取综合措施。

农业防治。疏除秋梢,短截春梢,清除树下修剪枝条带出桃园。
生物防治。保护害虫的天敌。

桃树蚜虫的天敌主要有中华草蛉、七星瓢虫、食蚜蝇、寄生蜂等。在天敌能够抑制蚜虫的情况下,可尽量减少喷药次数。

物理防治。蚜虫对黄色敏感,果农可以通过在果园悬挂黄色粘虫板来防治蚜虫。

化学防治。喷药时间定在花前、花后和新梢迅速生长初期。药剂可选择70%吡虫啉6000倍或者25%噻虫嗪2000倍液。为了提高药效,可以在药液中加入一定剂量的粘着剂,同时混喷甲维盐、高效氯氟菊酯等药剂。

陕西省富平县读者李威问:

鹅种蛋怎样孵化储存



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,鹅孵化期大约为30天。1-8天为37.9℃;9-18天为37.8℃;19天为37.8℃;20-30天为37.0-37.3℃。孵化初期要求相对湿度保持在

60%-70%;中后期要求相对湿度保持在50%-55%;出壳期要求相对湿度保持在65%-70%。孵化前25天,每天凉蛋1次,25天后每天凉蛋3-4次,但温度不能低于35℃。种蛋保存温度12℃-15℃,湿度70%-80%。最好在保存一周内孵化。



吉林省集安市读者王艺璇问:

白浆土种玉米用什么化肥



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说,白

浆土壤呈微酸或酸性,土壤粘重,通透性差,可施生石灰来中和酸性,减少酸性肥料使用,同时每公

顷可以施用30立方米的腐熟优质有机肥来改良土壤结构,每年都要深翻,改善土壤通透性。

陕西省汉阴县读者徐立哲问:

怎样防治花生叶斑病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说,

花生叶斑病发病初期建议及时用药,可选择兼具内吸和保护性的杀菌剂进行预防,如苯醚甲环

唑、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丁香菌酯等,最好选择两种或两种以上成分的复配药剂。

河南省开封市读者李雪君问:

高钾型肥料施用过多有何危害



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说,钾肥过多不但可

以阻碍氮元素吸收,使植株秆粗叶小,而且还能抑制钙元素吸收,使叶片干枯、果实脐腐等。此外,过量的钾肥

也会阻碍镁元素吸收,使整株中下部叶片出现褪绿黄斑,同时妨碍硼元素吸收,易造成蔬菜茎秆开裂。

陕西省铜川市读者徐为证问:

根结线虫为害西红柿,如何缓解



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,春季随着棚内温度不断升高,根结线虫也开始逐渐活跃

起来。对于有线虫的大棚,我们应提前做好线虫的防治工作。建议平时管理中及时冲施阿维菌素、噻唑膦等防治线虫的药剂,冲施时可以配合海藻酸、甲

壳素等生根剂,养护根系。用药时需要注意,噻唑膦一定要掌握好药量,因为用药量过大时很容易导致根系伤根,从而更容易遭受线虫侵染。

甘肃省白银市读者牛芳芳问:

牛身体长瘤怎样防控



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,及时发现病牛,隔离饲养,

严防病牛混群。全场定期用2%氢氧化钠水对牛栏、运动场、颈枷进行消毒。严格执行挤奶卫生规程,防止乳头皮肤创伤。

外科疗法:以弹性皮筋勒紧疣根部,阻断血流而坏死,自行脱落。伤口消毒可用液氮冷冻点化,使瘤体干性坏死。

(本版内容由赵思懿整理)