



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

四川省广元市读者
王臻问:

如何快速识别 真假农药



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说,可从查看农药产品的包装标签标识上识别。即按照相关的规定,农药产品包装袋上必须注明产品名称、有效成分含量、商标、净重、农药产品标准代号、剂型、农药使用方法、生产企业及农药生产许可证、登记证,以及限制使用农药等标签标识。如农药产品包装标签标识不完整,可以识别为不合格农药产品。

陕西省留坝县读者王凌鹏问:

黄瓜出现瓜条发黄、大头等现象,如何缓解



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,这是生理性问题,主要是瓜条营养不良引起的。近期生产中出现这种情况与连续

的弱光天气有关。弱光天气时,黄瓜光合作用差,有机营养合成不足,植株很容易出现上述现象。如果此时留瓜多,会加重这种问题出现。建议通过以下方面进行缓解:一是根据植株长势

和天气情况合理留瓜。二是叶面喷施游离氨基酸、鱼蛋白等叶面肥,为植株提供有机养分。三是冲肥时注意冲施海藻酸、游离氨基酸等类型的功能型生根剂,养护根系,提高根系吸收能力。

河南省郑州市读者祁玉洁问:

怎样防治西葫芦白粉病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,西葫芦白粉病是一种真菌性病害,可选的药剂很多,但不能单一使用一种药剂,否则会产生抗药性,增加防治难度。建议交替用药,可

选用苯醚甲环唑、啞菌酯、戊唑醇、啞啉铜、多抗霉素等,任选一种喷雾,5-7天一次,连用3次。白粉病在干湿交替的环境中利于发病,因此,除了及时用药,平时还应注意调控好棚室温湿度,避免温湿度起伏过大。



甘肃省武威市读者张华宇问:

牛磨牙、反刍减少、鼻镜干燥、粪便时干时稀,是什么病



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,分析诊断为牛前胃弛缓。治疗时,病初让病牛绝食1-2天,以后喂给优质干草和易消化的饲料,要少

给勤添,多饮清水。再用缓泻剂、制酵剂增强牛瘤胃的蠕动功能。对原发性前胃弛缓,用10%氯化钠液300-500毫升、10%氯化钙液100-200毫升和10%樟脑磺酸钠液20-40毫升,静脉注射效果较好。

病牛食欲废绝时,可静脉注射25%葡萄糖液500-1000毫升,每天1-2次;继发胃肠炎时,可口服黄连素4-8克,每天3次;发生酸中毒时,可静脉注射5%碳酸氢钠液1-2升。

山西省运城市读者任雷问:

吡唑萘菌胺类杀菌剂效果如何



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说,吡唑萘菌胺类杀菌剂属琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂,其杀菌活性广谱、持效期

长,兼具预防和治疗作用,以保护作用为主,对三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病菌高效,尤其对壳针孢属真菌防效优异;主要用于谷物、油菜、果树、蔬菜等作物,有效

防治谷物白粉病、眼斑病,小麦叶斑病、褐锈病、条锈病,大麦网斑病、云纹病、锈腐病、叶斑病和眼斑病等病害,并具有增产作用;另外可用于防治观赏植物真菌病害等。

陕西省蒲城县读者党阳问:

怎样防治西红柿细菌性髓部坏死



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,建议采用以下方法防治病情。

一是控制浇水、勤通风,最大限度降低棚内湿度。二是叶片喷施磷酸二氢钾等类型的叶面肥,促进叶片光合作用,健壮植株,避

免植株徒长。三是选择在晴好天气时整枝打杈,并及时喷施细菌性药剂,如春雷霉素、啞啉铜等,避免伤口感染。

陕西省澄城县读者裴松玉问:

怎样防治樱桃细菌性穿孔病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说,可按照以下方法进行防治。

加强果园管理。增施有机肥,避免偏施氮肥。注意果园排水。

合理修剪,降低果园湿度,改善通风透光条件。秋后结合修剪,彻底清除枯枝、落叶等,集中烧毁。

樱桃要单独建园,不要与桃、李、杏等核果类果树混栽,应在距离桃、李、杏园较远的地方。

谢花后,选择72%农用链霉素可湿性粉剂3000倍液或1.5%啞霉酮水剂800倍液或3%中生菌素可湿性粉剂800-1000倍液,每隔7-10天喷洒一次,连续喷2-3次。

(本版内容由赵思懿整理)