



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打 问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

湖北省丹江口市读者周超问:

母猪产仔 拒绝喂奶咋办



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,这是母猪母性不强的一种表现。

解决办法:一是将母猪尿涂到每个小猪身上,母猪闻到后就可以喂奶。

二是给母猪喝熟豆浆,当乳房充满乳汁时,母猪会产生膨胀感,就会喂奶了。

三是人工辅助仔猪吃奶。

陕西省澄城县读者韩梦琳问:

樱桃幼果期,怎样防治病虫害



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说,幼果期是病虫害防治的关键时期,果农一定要加强管理。

病害。此期需提前防控细菌性穿孔病,可用2%春雷霉素水剂2000倍液喷雾防治;褐腐病用80%代森锰锌可湿性粉剂600倍液或10%苯醚甲环唑水分散剂1500倍液等进行喷雾防治。

虫害。蚜虫用25%噻虫嗪水分散剂3000-5000倍液;金龟子、樱桃实蜂、蛾类等可用5%高效氯氟氰菊酯微乳剂2500倍液;叶螨用3%阿维菌素微乳剂3000倍液进行喷雾防治。果蝇防治采用地面处理,用杀虫剂拌土撒施,果实着色后,采用短稳杆菌600倍液或0.3%苦参碱600倍液进行树上喷雾。



甘肃省静宁县读者李干问:

怎样防治苹果黑绒金龟子



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授马志锋回复说,金龟子成虫在早晨或傍晚气温较低时活动性差,并有假死习性,可在此时人工捕杀

或树底铺塑料布摇树振落捕杀。金龟子有趋光性,可用灯光诱杀,也可在果园周围点火诱集,捕杀成虫。果园养鸡,以禽治虫。避免施用未腐熟的农家肥,以免招惹金龟子产卵。

在成虫发生初期用5%辛硫磷颗粒剂处理土壤,或地面喷施75%辛硫磷1000倍液,浅锄入土,毒杀成虫。傍晚用4.5%高效氯氟氰菊酯乳油2000倍液等树上喷雾。

陕西省勉县读者张庆文问:

怎样防治马铃薯晚疫病



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,近期气温回升,降雨多,马铃薯晚疫病易发生。种植户在晚疫病病菌侵染前或始发病期用药,现

蕾期要喷第一遍药,根据天气和发病情况提前或延后喷雾。晚疫病发病前可选用保护性杀菌剂进行喷雾保护,如用药前已显病,第一遍药要使用兼有治疗、铲除和保护作用的药剂,以便压低菌源基数。

保护性杀菌剂可选用75%代森锰锌水分散剂或25%双炔酰菌胺或10%氰霜唑喷雾。内吸治疗杀菌剂可选用68.75%氟吡菌胺·霜霉威或25%啞菌酯或60%吡唑醚菌酯·代森联喷雾。

陕西省榆林市读者马明辉问:

羊蹄长走路不稳咋处理



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级畜牧师史瑞仁回复说,可以给羊固定后修蹄。修蹄可以选择在雨后进行,此

时蹄壳较软,容易操作。修蹄的工具主要有蹄刀、蹄剪(也可用其他刀、剪代替)。修蹄时,羊呈坐姿保定,背靠操作者。一般先从左前肢开始,术者用左腿夹住羊的左肩,使

羊的左前膝靠在人的膝盖上,左手握蹄,右手持刀、剪,先除去蹄下的污泥,再将蹄底削平,剪去过长的蹄壳,修得与蹄底接近平齐。不要修蹄过度,以免流血或引起跛行。

陕西省铜川市读者严飞龙问:

怎样防治辣椒畸形果



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,辣椒畸形是辣椒生产中常见的一种生理性问题。

生产中花芽分化不良、植株营养不平衡都能导致这种情况发生。近期出现的畸形果大部分是前期连阴天植株花芽分化不良引起的。

缓解建议:一是对于已经出现的畸形果,根据植株长势适当摘除,果子旺的可暂时不要摘。二是叶面喷施磷酸二氢钾配合硼肥促进花芽分化。

山西省太原市读者王自卫问:

西红柿茎秆内部变褐、腐烂中空,严重的死棵,是什么病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,这是西红柿细菌性髓部坏死病,在高湿条件下发病重,病

菌可通过伤口侵染植株。防治措施:首先是注意调控棚室环境,及时通风排湿,降低棚内湿度。其次是整枝抹杈后保护好伤口,同时注意避免

接触传播病菌。最后是及时合理选择药物防治,整枝打叶后立即用王铜或铜高尚或可杀得等药剂预防,兼治细菌性软腐病等。

(本版内容由赵思懿整理)