



码上看报



码上订报

农业科技报® 全媒体出品



扫二维码
咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

陕西省蒲城县读者
刘祥均问：

怎样防治梨木虱

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说，近期持续高温，期间有降雨，病害侵染加快，建议果农抓住关键时期，积极采取有效措施，选择高效、低毒无公害药剂进行防治。

防治药剂可选用22.4%螺虫乙酯悬浮剂3000倍液、30%噻虫·高氯氟悬浮剂1200倍液、70%吡虫啉水分散粒剂8000倍液、5%啶虫脒可溶性粉剂2500-3000倍液等。

陕西省子洲县读者杨丹丹问：

茄子发生红蜘蛛，如何防治

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，虫害发生初期，种植户可喷施20%复方浏阳霉素乳油1000倍

液、1.8%阿维菌素乳油1500-2000倍液、15%哒螨灵乳油3000倍液、50%四螨嗪(阿波罗)悬浮液5000倍液、20%螨克(双甲脒)乳油1000-1500倍液、

73%克螨特2000-3000倍液、50%螨代治(溴螨酯乳油)1000-2000倍液进行防治。每6-7天喷施1次，药剂可交替使用，连续使用2-3次即可。

陕西省澄城县读者赵州问：

玉米叶片出现灰褐色、长梭形病斑怎样管理

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，根据描述，应该是玉米大斑病。为彻底防治该病发生，要避免连作，种植抗病性强的玉米品种，保持玉米田间的良好通风和阳光照射。收获后，及时清除田间的病残体。

药剂防治时，可选用20%烯酰菌酯·戊唑醇悬浮剂(爱可)20毫升/亩、10%的苯醚甲环唑水分散粒剂30毫升/亩、25%吡唑醚菌酯悬浮剂15毫升/亩等进行防治。尽量做到联防联控、群防群治，达到彻底防控的效果。严重田块间隔7天喷药一次，连喷2次；注意交替用药，防止产生抗药性。



甘肃省静宁县读者吴一迪问：

夏季圈舍养猪，如何预防猪中暑

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，在高温多雨的夏季，圈舍的最适温度应在10℃-25℃(仔猪

在7日龄前应在32度左右)，相对湿度为60%-70%。超出这个范围，就易引发猪中暑。养殖户应合理调控环境，对个别发病猪要及时移到阴凉处，保持安静，用凉水喷淋全身

或用凉水灌肠。对心脏功能不全的病猪，可肌注安那伽或樟脑磺酸钠、地塞米松。如病猪烦躁不安，出现痉挛、抽搐，要灌服水合氯醛或肌注2.5%的氯丙嗪10-20毫升。

河南省平顶山市读者田维芳问：

西红柿出现青肩果，是品种原因吗



答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研

究员李省印回复说，造成西红柿青肩的原因有品种、营养生长过剩、

缺乏钾硼元素、碳氮比失调、高温等，建议从以上原因进行分析。

河北省张家口市读者王强问：

黄瓜有黄褐色小横纹，跟皱皮很相似，如何防治

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，这是生理性病害，主要由缺硼引起，植株缺硼会造

成果皮木栓化，容易出现小横纹等类似皱皮症状。生产中造成蔬菜缺硼的原因很多，如偏施化肥、土壤中缺硼、植株根系发育不良等，建议在黄瓜定植

前的底肥中补充硼肥，黄瓜生长期间可喷施螯合态单质硼肥，或者喷施含氨基酸和硼、镁、锌的叶面肥，5天喷一次，连喷2-3次。

陕西省商南县读者黄西问：

夏季怎样防治花生病虫害



答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，种植户可亩用4.5%高效氯氰

菊酯乳油30毫升或10%吡虫啉可湿性粉剂20克+5%己唑醇悬浮剂30毫升或43%戊唑醇悬浮剂10克+99%磷酸二氢钾100

克，兑水40公斤均匀喷雾，每隔5-7天喷药一次，连喷3次可起到防病、防虫、壮籽、增加含油量及增产的作用。