



码上看报



码上订报

农业科技报® 社全媒体出品



扫二维码
咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

安徽省泗县读者吴金错问：
大棚土壤为砖红色
pH值为6
怎样改良

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回答说，土壤为砖红色，这是土壤盐渍化的标志。土壤pH值为6，属于微酸性土壤。要想改良该类土壤，需要一个较长的过程，应该深翻地灌大水，以水压盐，减少化肥的用量，大量增施有机肥和生物有机肥，实行轮作换茬，要坚持数年才能见效。

河南省延津县读者赵金平问：

往年小麦易发生全蚀病，如何预防

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授王成社回复说，全蚀病一般发生区，用3%敌萎丹（苯醚甲环唑）60毫升或3%敌萎丹（苯醚甲环唑）40毫升+2.5%适乐时（咯菌腈）20毫升，拌麦种10公斤。病情严重发生田可用12.5%硅噻菌胺悬浮剂（全蚀净）每亩30毫升进行拌种。全蚀病严

重发生区要在药剂拌种的基础上，辅以药剂处理土壤，以提高防治效果。每亩使用70%甲基托布津2-3公斤或50%福美双3-5公斤加细土20-30公斤制成毒土撒施。

河南省许昌市读者张荣光问：

许昌适合种植苹果树吗

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授马志锋回复说，根据当地的自然条件来看，农户可以种植苹果树，但必须为早熟品种。建议农户种植苹果树时，要选择排水性好、肥沃适宜的土地。以无机肥和有机肥混合施用为宜，尽量少施用化肥，避免土地沙漠化。定期清理苹果树枝梢部分，有利于维护果树空间平衡，促

进果实生长发育。在保证营养的前提下，每年至少进行一次清枝工作。定期对果树进行健康检测，根据检测结果定制病虫害防治方案，及时发现并解决病虫害问题。

陕西省勉县读者苏林问：

黄瓜瓜条有黄色水渍状病斑是什么病害

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，可能是黄瓜靶斑病，防治可采取以下措施：一是选用抗病品种。二是与非瓜类作物实行2-3年以上轮作，彻底清除前茬作物病残体，减少初侵染源，同时喷施消毒药剂进行消毒处理。三是药剂防治。如发现病情使用黄瓜靶斑净25克兑水15千克均匀叶面喷施，发生严重地块适当加大浓度，间隔5-7天再喷施1次，可以起到非常好的防治效果。



山东省寿光市读者张春晓问：

茄子植株出现“断头”情况，如何缓解

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回答说，这是生理性病害，引发原因主要有两方面：植株徒长，茎秆脆；温度湿度变化剧烈，植株生长不协调。建议菜农平衡棚内温湿度，避免温差过大，保持土壤湿度的相对均衡，叶面喷施叶面肥促壮植株。

陕西省大荔县读者李雨恒问：

甜瓜茎基部开裂并有红褐色的胶状物颗粒，是什么病害

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说，这是甜瓜蔓枯病。蔓枯病是甜瓜生产过程中常见的病害之一。该病能够造成多部位、多时期侵染的特点，能够同时侵染植株的叶片、茎秆、果实等多个部位，在苗期、生长期和后期等多个时期发病。管理过程中，注意降低田间湿度，发病前期及时喷洒药剂防治。

甘肃省庆阳市读者王秋问：

小猪出生12天后拉肚子不止，怎么办

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级畜牧师史瑞仁回复说，应该是胃肠炎和大肠杆菌混合感染造成的拉稀和腹泻，可以采用综合措施对症治疗。注意补水，防止电解质失衡，同时服用增强免疫力的药物。虽然发病后有一定的方法治疗，但是最好的办法还是做好预防。母猪产前，圈舍要严格消毒；生产后，仔猪吃奶时，要保证母猪乳房干净卫生，乳头、乳房要经常擦洗。在产前一月左右，给母猪打传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联疫苗，产前可通过胎盘供应、产后通过奶水传给仔猪一些抗体，可减少发病几率。

（本版内容由赵思懿整理）