



码上看报



码上订报

农业科技报 全媒体出品



扫二维码 咨询农科专家



请拨打 问农热线 029-87036603



陕西省西安市读者张秋雨问:

棚内部分小黄瓜 皱皮,如何预防



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,皱皮小黄瓜在棚内分散发生,果皮上受害面积不大,由此可见,这应该是蓟马为害导致的。对此,菜农应重点做好蓟马的防治工作,选用乙基多杀菌素+吡虫啉、多杀菌素+溴氰菊酯等药剂组合进行喷施,间隔5-7天一次,连续喷施2-3次。同时,注意轮换用药,药剂浓度不可过大,以免产生药害。

陕西省渭南市读者康安问:

怎样科学防治小麦红蜘蛛



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,小麦红蜘蛛是麦田发生最早、危害较为普遍的一种虫害,其个体较小、繁殖速度快,且前期不易发现,经常有农户因防治不及时造成红蜘蛛大面积发生,造成小麦植株矮小、叶片发黄,后期难出穗或穗小粒轻,严重影响小麦的产量和品质,带来不可估量的损失。

小麦红蜘蛛防治指标:麦长腿蜘蛛单尺行长螨量100头,麦圆红蜘蛛单尺行长螨量200头。

防治药剂可选用:5%阿维菌素悬浮剂4-8毫升/亩、20%联苯·三唑磷微乳剂20-30毫升/亩,4%联苯菊酯微乳剂30-50毫升/亩、20%马拉·辛硫磷乳油45-60克/亩喷雾防治,同时可通过中耕除草、合理肥水管理等农业措施,降低田间虫量。

湖北省武汉市读者苏时榕问:

寒冷季节 怎样饲喂蛋鸭



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,寒冷季节蛋鸭的饲料要营养丰富,搭配合理,饲料中要适当增加玉米等高能量的饲料,使得饲料中粗蛋白质含量达到18%-20%,钙2.5%-2.8%,磷0.45%-0.55%;保证钙在饲料中的配比,定量添喂青绿饲料,补充多

种维生素,每公斤饲料中应有40-60毫克。

要使蛋鸭保持较高的产蛋率,必须日喂4次,第四餐放在晚上喂。夜间10-11时给鸭群加喂夜餐,比不喂夜食的蛋鸭可提高产蛋量7%-9%。喂料时,鸭舍内的料槽要加放5-6个,使每只鸭都能吃到夜餐,保证鸭群产蛋整齐度,便于管理。



陕西省西安市鄠邑区读者宋耀春问:

葡萄园冬季如何防治病虫害



答 杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说,可以参考以下方法进行

管理。 喷药护叶。加强防治白粉病、锈病、霜霉病等病害。结合病害防治,可用0.3%尿素加0.5%磷酸二氢钾作根外追肥,能起到促使枝条

老熟的作用。

全面清园。葡萄采摘后全面清除田间及架面烂果以及落叶、病叶等,出园集中埋烧,以减少病源。清园后用石硫合剂,对架面、地面同时喷打,进行全面清毒。

整形修剪。一般选在葡萄植株自然落叶2周后开始进行,在不需要埋土防寒地区,修剪时间一

直可以延续到第二年植株开始生长之前。

病虫害防治。白腐病、霜霉病、炭疽病等可用多菌灵、甲基托布津等药剂交替使用防治。

冬剪后,将剪下枝条集中拿出田园。4-7天后,用石硫合剂全园清园杀菌、杀虫一次,以消除翌年病虫害来源。

陕西省安康市汉滨区读者张雪峰问:

番茄果实四周的叶片摘除后,空洞果非常多,怎样管理



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,叶片是制造营养的器官,特

别果实上部的功能叶片,若摘除过多,会导致营养供应减少,果实膨大就会受到影响,从而出现空洞果。番茄进入转色期后,建

议不要一次性摘叶过多,尤其上部叶片不要摘除。此外,还要注意养护根系,及时补充矿质养分,减少空洞果发生。

陕西省彬州市读者杨婷问:

茄子果肉变黑,顶端凸凹不平,是怎么回事



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,茄子果肉变黑主要是中微量元素如钙、硼等吸收不足导致的。特别是遇到连阴

天等恶劣天气,棚室内光照弱,植株光合作用缓慢,有机营养供应不足,根系活力下降,植株难以吸收到足够的营养,从而导致茄子黑心。菜农应注意营养供应的配比,坐果以后,茄子对于磷、钾肥的需

求量增加,注意及时补充。同时注意养根护根,使用甲壳素、氨基酸等肥料促进根系发育,提高根系活力,提高植株对病害的抵抗力。开花结果初期,及时喷洒含硼钙的叶面肥。

(本版内容由赵思懿整理)