



码上看报



码上订报

农业科技报® 全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

吉林省双辽市读者周迪文问:

猪伪狂犬病咋治疗

答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,猪伪狂犬病是一种急性传染病,对猪危害大,可致妊娠母猪流产、产死胎等;初生仔猪多为急性致死性经过,具有明显的神经症状,死亡率几乎100%;成年猪多呈隐性感染状态。该病基本上没有治疗方法,只有在母猪配种前接种疫苗,才能获得保护。目前可用免疫球蛋白、黄芪多糖、镇静类药物试验救治。

陕西省武功县读者李兵问:

怎样防治小麦红蜘蛛



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授王成社回复说,近期气温回升,利于小麦红蜘蛛的迅速繁殖和危害,并即将进入发生盛期,如

不及时防治,将影响小麦的正常生长及后期的丰产丰收。

防治适期:3月下旬—4月上旬。

推荐药剂:阿维菌素或达螨灵或阿维·哒螨灵等药剂。

防治指标:小麦红蜘蛛单尺行长(即33.3厘米)虫量200头。

注意事项:喷药时间应在上午10点以前或下午4点以后进行,此时小麦红蜘蛛活动最为旺盛,防效较好。

陕西省礼泉县读者齐云问:

为棚菜冲施豆饼肥,注意事项有哪些



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员徐福利回复说,豆饼冲施使用时,应该注意以下几个事项:

一是要充分腐熟,可以添加

微生物菌剂,如粪肥腐熟剂等,与水混合,棚室温度下发酵10-15天后使用。

二是冲施前,豆饼中适当添加阿维菌素或虫酰肼等药剂,预防地下害虫发生。

三是豆饼应分次少量使用,防止造成地表郁闭。这是因为豆饼类肥料如果用量过多,很容易在地表形成一层粘质层,影响地表土壤通透性,不利于根系吸收养分,最终影响黄瓜生长。

陕西省旬邑县读者张霓问:

苹果园春季如何清园



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授马志锋回复说,春季清园是苹果全生育期病虫害防治的关键环节。春季清园施药的最佳时间是萌芽—露白前,主要防治对象有腐烂病、霉心病、白粉病、蚧壳虫等枝干病虫害。

防治药剂组合方案:

单施石硫合剂。萌芽前喷施(涂杆)3-5波美度的石硫合剂是非常理想的清园药剂。

喷施广谱高效、渗透性强、

触杀性好的杀菌、杀虫剂。目前用于清园的杀菌剂多为三唑类,杀虫剂主要是毒死蜱、丙溴磷等有机磷类或其复配制剂。具体方案如下:方案一:25%丙环唑乳油3000倍液+10%浏阳霉素500倍液,主要防治白粉病、锈病、花腐病、芽枯病、螨类以及绵蚜。方案二:25%腈菌唑3000倍液+24%螺螨酯2000倍液+芸苔素2000倍液,主要防治白粉病、锈病、螨类、壁虱、蚧壳虫等。



陕西省米脂县读者薛涛问:

怎样种植山地红葱



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说,春分已过,目前正是红葱种植的最佳时节,种植户可按照以下方法进行种植。

1.忌重茬。最好与粮食作物轮作,不与十字花科、伞形花科类

蔬菜轮作。

2.土壤及处理。种植前翻耕,施用农家肥和复合肥料等。杀虫剂要在墒情较好时均匀撒施;菌肥与农家肥拌均后撒施深翻。

3.田间管理。培育壮苗,适时早播,减少氮肥使用量,增施腐熟

的有机肥,重施磷、钾肥,实行平衡施用肥。红葱栽后至整个生长期要经常中耕除草,全年一般进行3-4次。

注意事项:整个种植区坚决禁止生粪进地。收获后,立即清理枯叶、烂茎、根,减少虫、菌基数。

山西省运城市读者李富凯问:

使用可杀得叁仟3000倍防治黄瓜靶斑病效果不好,该怎么办



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,用药浓度偏低,导致可杀得叁仟防病效果减弱,而且可杀

得叁仟是广谱性杀菌剂,属保护性药剂,内吸性差,对细菌性病害效果较好,而靶斑病是真菌性病害,一旦发病,单纯用可杀得叁仟效果并不好。

建议改用10%苯醚甲环唑,或者选用复配药剂,如吡唑醚菌酯+戊唑醇+几丁聚糖,注意用药时要喷施均匀,将叶面叶背全都喷到,提高用药效果。