



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五
上午9:00-12:00
下午3:00-6:00

陕西省靖边县读者
马金香问:

如何防止 母兔假孕现象



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,母兔假孕是指母兔在交配后16-18天出现临产行为,乳房膨胀、叼草拉毛,但并无子兔产出的现象。为减少母兔假孕,种兔场可选择重复配种,即在第一次配种5-6小时后再用同一只种公兔进行第2次交配。商品兔场可采用双重配种法,即在第2只公兔交配后过15分钟再用另1只种公兔交配1次。当发现假孕后,将其立即放进公兔笼内进行配种,一胎即可准胎。

宁夏回族自治区固原市读者张亚荣问:

已包衣玉米种,需要晒种吗



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,玉米

种子包衣前通过晒种可增强酶的活性,提高种子的发芽势和发芽率,还能起到杀菌作用。已经包衣的种

子,表面已经有杀菌剂,且种衣剂暴露在阳光下,药效易降低,所以不建议将种子在阳光下暴晒。

陕西省商南县读者李磊问:

怎样防治小麦蚜虫、麦蜘蛛



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授王成社回复说,科学用药是确保防控效果的关键环节。一是在小麦穗期,采取以防治条锈病、赤霉病、麦穗蚜等为主的“一喷三防”技术,综合控制病虫害危害。用药配方为:亩用43%戊唑醇10克+6%联菊啉虫脒30

毫升+99%磷酸二氢钾100克,兑水40-50公斤混合喷雾。二是指导农民开展防治时,选择在晴朗无风天气时喷药;按照药肥标签标注的使用剂量施药,合理混配使用药肥,不得超剂量、超范围施药,以防造成药害。根据不同的施药器械,科学调整喷液用水量,确保防治效果。



陕西省丹凤县读者杜泽问:

当前葡萄病虫害的防治重点是什么



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授仵均祥回复说,葡萄萌芽期,对于枝干病害严重的葡萄园,及时挖掉死树,并采用醚菌酯、苯醚甲环唑或解淀粉芽孢杆菌等生物、化学农药对死树周围土壤

进行消毒,对死树邻近健康植株及田间病株进行药剂灌根。

展叶期主要预防霜霉病和白粉病,可选择波尔多液等铜制剂、代森锰锌、氨基寡糖素或丁子香酚等保护剂全株喷雾1-2次。要及时清除萌芽和多余副梢。此期

的主要害虫有叶蝉、绿盲蝽、缺节瘿螨等,可选用氟啶虫胺腈等杀虫剂、杀螨剂全株各喷施1次,预防叶部害虫害螨。当枝干上发现东方盔蚧的褐色介壳时,应用硬毛刷去除介壳并对全株喷施1次噻虫嗪来防控。

陕西省蒲城县读者党桓问:

怎样科学防治花椒树流胶病



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,在春季,种植户要及时喷甲基硫菌

灵、石硫合剂、百菌清等广谱性杀菌剂预防,在发病高峰临近期,喷施代森锰锌、中生菌素或菌毒清,交替使用,隔一周连喷2-3次,预

防病菌蔓延,虫害严重时应及时施药防治。对于已发生的病斑,要及时刮除,涂抹石硫合剂、辛菌胺醋酸盐进行保护。

甘肃省天水市读者胡伟芳问:

喷药治病后,黄瓜叶片发黄脱落怎么办



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,这是药剂喷洒不当

造成的药害现象。建议选择安全性高的药剂,药剂混用时做到先试后用,喷药时间选择在傍晚进行,严格控制药物使用浓度,

才能降低药害发生的几率。药害发生后,应及时喷洒芸薹素内酯或清水及氨基酸类的叶面肥,减缓其危害。

河南省郑州市读者李策问:

黄瓜中部叶片萎蔫,数天后干枯,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,萎蔫的表面现象为急性凋萎,诱发的深层原因为土壤盐渍化、盐分浓度过大,阻碍水分吸收。此

外,黄瓜根系不好,根量少或感染了根腐病,使根系难以正常吸收水分,也会导致叶片萎蔫。想要从根本上避免这种现象发生,应以改良土壤、治理盐渍化为主方向,目前主要解决烂根问题。建议用阿米西达

1500倍加铜高尚500倍灌根1-2次防治烂根,可以混加爱多收或甲壳素养根护根,提高根系抗逆性。管理中还应注意适当遮阳,并根据植株长势适量喷洒清水,达到及时补水、促进叶片恢复的目的。

(本版内容由赵思懿整理)