



码上看报



码上订报

农业科技报® 全媒体出品



扫二维码,咨询农科专家



请拨打  
问农热线



029-87036603

热线时段:

每周一至周五  
上午9:00-12:00  
下午3:00-6:00

陕西省靖边县读者薛涛涛问:

### 育肥猪腹泻 怎样用药



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说,如果是病毒引起的腹泻,应停止喂干料,用温水冲成稀粥状,并加入补液盐、益生菌,连喂3-5天,当腹泻停止后,再逐渐加干料。喂稀食的同时,肌肉注射猪白细胞干扰素,每天1次,连用3天。同时肌肉注射博落回,每天1次,连用5天。

陕西省蒲城县读者赵宗岳问:

### 怎样防治苹果、梨锈病



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说,建议果农对锈病重发区域立即开展药剂防治,其他区域结合当前病虫害综合防治,进行预防。

桧柏、刺柏防治。检查菌瘿、“胶花”是否出现,及时剪除、集中销毁。在桧柏上喷1-2波美度石硫合剂。

果园喷药防治。40%腈菌唑可湿性粉剂5000倍、5%己唑醇水乳剂1500倍、30%苯醚甲环唑悬浮剂5000倍,以上药剂任选一种。间隔7-10天再喷一次,交替使用,特别是在透雨后,必须立即喷药。锈病的防治不能只注重果园的施药,同时要对果园周边的桧柏、刺柏进行喷药处理。



陕西省子长县读者魏文娟问:

### 怎样防治番茄潜叶蛾



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,菜农需多措并举,防治番茄潜叶蛾。

农业措施。选择抗性品种,移植洁净苗,与非寄主植物轮作。

物理防控。棚室门口、通风口安装防虫网,阻融害虫迁入;在地面放置蓝色诱虫板,诱杀成虫,并注意及时更换。

悬挂性诱捕器或交配干扰技术。悬挂番茄潜叶蛾信息素诱捕器,将性诱捕器直接置于

棚室内地面上或悬挂于近地面处;悬挂迷向丝或迷向管,60个/亩。

化学防治。可选用阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺等。

陕西省延安市宝塔区读者袁思问:

### 怎样防治地下害虫



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说,种植户要通过杀虫灯诱杀、人工捕捉等方法积极防治地下害虫,确保苗齐苗壮。

土壤处理。每亩用50%辛硫磷乳油250毫升拌土于播种

前撒施或用10%辛硫磷颗粒剂,每亩1.5-2.0千克均匀拌入种肥中播种。

撒施毒土。苗期用48%毒死蜱乳油200毫升/亩,拌细土10千克制成毒土,撒施于播种沟或播种穴内,覆一层细土后再行播种,在黄昏时撒在田间作物行

间,利用地下害虫昼伏夜出的习性将其杀死。

药剂灌根。对虫害发生严重的地块,要及早进行灌根。灌根可用48%毒死蜱或40%辛硫磷每亩100-150毫升兑水50-75公斤,在下午4时开始灌苗根部,杀虫率达90%以上。

甘肃省酒泉市读者李磊问:

### 杏树枝梢叶片长成一簇、颜色变红,怎样防治



答:杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学教授花蕾回复说,这是杏疗病,由真菌引起。

果农发现病梢、病叶、病芽后,

要及时全面剪除烧毁或做无害化处理,连续3-4年全面清理病枝、病叶的杏园可基本消灭或控制杏疗病危害。杏树冬季修剪后到萌芽前,对树体全面喷布5波美度

石硫合剂。对没有彻底清除病枝的地区,可在杏树展叶时喷1:1.5:200倍的波尔多液,或14%络氨铜水剂300倍液。每隔10-15天喷1次,连续1-2次。

湖北省十堰市读者郑鸿飞问:

### 如何防控羊伪狂犬病



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师史瑞仁回复说,伪狂犬病发生率很高,必须接种疫苗进行预防。

疫苗接种。用伪狂犬病弱毒细胞苗进行免疫接种,接种6天后产生免疫力,保护期可达1年。

加强管理。羊舍及运动场定期消毒;保证营养全面均衡;提

倡自繁自养,不从疫区引入种羊;购入羊要严格检疫,阳性羊要扑杀、销毁,同群羊隔离观察,证实无病后方可混群饲养;养羊场要远离养猪场。

陕西省扶风县读者李玉问:

### 大豆地能种香瓜吗



答:杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说,一般

来说,大豆地不建议种瓜类作物,因为大豆生长过程中要使用一些长药效药剂,如豆磺隆,这类药剂

会对瓜苗有影响,轻者瓜苗长势弱、瓜果品质不好,重者会导致死秧,严重影响产量和品质。

(本版内容由赵思懿整理)